



التراكيب:

كل بخة تجوي ٥٠ ميكروغرام مومنيتازون فيروات مونوهيدرات .
عدد дыханий في عبوة الكوميد رذاذ الأنف ١٢٠ بخة .

الزمرة الدوائية :

مومنيتازون فيروات مومنوهيدرات ، المكون الفعال لـ الكوميد رذاذ الأنف ، هو عبارة عن مضاد التهاب كورتيكosteroid .

الكوميد رذاذ الأنف هو بخاخ بجرعات معيرة يتكون من وحدة مجهرة بمضخة يدوية وتحوي ملعق مائي من مومنيتازون فيروات مومنوهيدرات بما يعادل ٥٪ .

بعد التحضير الأولي للبخاخ (إجراء ١٠ دفعات للمضخة) ، تجوي الدفعة الواحدة رذاذ معير فيه ١٠٠ ملغم من المعلق الحاوي على مومنيتازون فيروات مومنوهيدرات بما يعادل ٥٠ ملغم من مومنيتازون فيروات ، محسوبة على أساس لا مائي .

آلية التأثير :

تعمل الكورتيكosteroides مثل مومنيتازون ، بشكل رئيسى على تخفيق أو منع التهاب بطانة الطرق التنفسية ، كما تخفف الاستجابة التحسسية للمواد المستنشقة والحساسية ، بالإضافة إلى كونها تثبط إفراز المواد المخاطية ضمن الطرق التنفسية .

الحراثة الدوائية :

لا يمكن كشف مومنيتازون مونوهيدرات المستخدم بشكل ياخذ أنفي في البلازما على الرغم من استخدام طرق معايير حساسة بحدود كمية دنيا من رتيبة ٥٠ بيكولوغرام . وقد أظهرت الدراسات أن جرعة المومنيتازون فيروات التي تم بلعها وامتصاصها تتعرض لعملية استقلاب واسعة تتحول إلى مستقبلات عديدة . عند الاستخدام عن طريق الوريد فإن عمر نصف انتراح مومنيتازون من البلازما يبلغ ٥،٨ ساعة . وأي دواء منعش ينطرح على شكل مستقبلات عن طريق الصفراء بشكل أعظمى و عن طريق البول بحدود دنيا .

الاستطبابيات :

- يستخدم الكوميد رذاذ الأنف في علاج الأعراض الأنفية الناتجة عن التهاب الأنف التحسسي الفصلي والدائم لدى البالغين والأطفال بعمر ٣ سنوات و ماقبل .
- كذلك يستخدم في الوقاية من هذه الأعراض عند البالغين والأطفال بعمر ١٢ سنة فما فوق .

مضادات الاستطباب :

- الكوميد رذاذ الأنف لا يستعمل لدى المرضى الذين لديهم حساسية مفرطة لأبي من مكونات المستحضر .

- يجب عدم استخدام الكورتيكosteroides عن طريق الأنف أو استخدامها بحدى شديد في المرضى المصابين بالتندر الرئوي ، أو المصابين بأختناق قطري أو جرثومية أو فيروسية جهازية غير معالجة ، أو المصابين بالحلايب العيني .

الآثار الجانبية :

تضمن التأثيرات الجانبية التي تترافق مع استخدام الكوميد رذاذ الأنف : صداع ، نزف أنفي ، ظهور لون زهري في المخاط ، ألم في الحلق ، حس حرقة ، تخريش داخل الأنف ، واضطراب الدورة الطمئنة .

التحذيرات :

- إن استبدال المعالجة الكورتيكosteroides الجهازية بالمعالجة الموضعية يمكن أن يترافق باعراض فصوص كظري بالإضافة إلى أن المريض يمكن أن يعاني من اعراض سحب مثل ألم المصطلات والمقابلات والتعب والاكتئاب .
- كما تظهر هذه الأعراض في حالة الإنفاص السريع جداً في جرعة الكورتيكosteroides الجهازية .
- يمكن أن يحدث أعراض سحب كورتيزون ، والتي تتضمن بشكل نادر عدم تناظم الشهريدة وظهور أفات العد الشائع وظاهر كوشينغ ، عند تجاوز الجرعات الأنفية الموصوح بها من الكورتيكosteroides أو عندما يكون المريض حساس للكورتيكosteroides أو مصالح حديثاً سترور ونيدات جهازية .
- في حال حدوث هذه الأعراض يجب إيقاف الكورتيكosteroides أو نيدات عن طريق الأنف ببطء واتخاذ الإجراءات المقاولة لإيقاف المعالجة بالستيرويدات عن طريق الفم .
- المرضى المعالجين بأدوية تثثيل المناعة يمكنون أكثر تعرضاً لحدوث الأحشاء فضلاً للتعرض لأمراض الأنفية وجريي الماء يمكن أن يكون خطيراً أو أحياناً قاتلاً في البالغين والأطفال غير الممنوعين والذين يخضعون للمعالجة بالكورتيكosteroides أو نيدات ، لهذا يجب أخذ الحذر في تحذير تحذير هؤلاء الأشخاص ، الذين لم يصابوا بهؤلاء هذه الأمراض ، للإصابة .
- في التجارب السريرية التي أجريت على الكوميد رذاذ الأنف حدث حالات اصابة موضعية بقطور المبيضات البيض في الأنف والحلق ، ولكن بشكل نادر ، في حال حدوث مثل هذه الإصابة يجب إيقاف استخدام الكوميد رذاذ الأنف والبدء بالمعالجة الموضعية أو الجهازية لهذه الإصابة ، إذا دعت الضرورة .

يمكن أن يحدث بشكل نادر فرت حساسية بعد استعمال الكوميد رذاذ الأنف عن طريق الأنف ، حيث يمكن حدوث أزيز نفسي في حالات نادرة جداً .

كما معالجة موضعية أنفية طويلة الأمد ، يجب أن يخضع المرضى الذين يستخدمون الكوميد رذاذ الأنف لفحوص دورية لاحتمال حدوث تغيرات في المخاطية الأنفية .

بسبب تأثير الكورتيكosteroides المبطن لشفاء الجروح ، يجب على المرضى الذين عانوا من فرومات الأنفية أو خضعوا لجراحة أو رضوض الأنفية لا يستخدموها الأنفية حتى تمام الشفاء .

يمكن أن تترافق المعالجة بالكورتيكosteroides عن طريق الأنف أو الاستنشاق ، بشكل نادر جداً ، بحدث علوكما أو الساد أو كلها مع لها يجب متابعة المرضى الذين لديهم تغيرات في الرؤيا والذين لديهم تاريخ إصابة بالغلوكونا أو الساد .

الحمل (الفترة C) :

كغيره من الكورتيكosteroides ، فإن الكوميد رذاذ الأنف يمكن أن يستخدم عند النساء الحوامل إذا تعافت فائدته للألم مع الضرر الذي يمكن أن يحدث للجنين ، مع ملاحظة تخفيف الجر عات في هذه الحالة بسبب ارتفاع نسبة الكورتيزون المناعي أثناء الحمل .

* هذا دواء *

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- لا تكون الأدوية في متقدون أيدي الأطفال .
- الماء - مسكن يزور على سحنان وسهلاكه خلافاً للمتطلبات يعرضه للخطر .
- اربع بدقة ونمة الطبيب وطريقة لاستعمال المخصوص علىه وتعليمات الصيدلي الذي صرحت له .
- الطبيب والصيدلي مما يخبران بالدواء ونوعه وقوته .
- لا تقطع مدة الدواع لفترة لا تزيد عن ٣٠ يوماً .
- لا تكرر سرف الدواة دون وسفة طبية .
- مجلس وزراء الصحة العرب (اتحاد الصيادة العرب)

مفتريات ميديوتكت للصناعات الدوائية