



AZEDERM Cream



Composition:

Each 1gr Azederm cream contains 200mg Azelaic acid.

Clinical pharmacology:

- Azelaic acid demonstrated a reduction in the thickness of the stratum corneum, a reduction in number and size of keratohyaline granules.

Indications and usage:

- Indicated for the topical treatment of mild-to-moderate inflammatory acne vulgaris.

Contraindications:

- Contraindicated in individuals who have shown hypersensitivity to any of its components.

Warnings:

- **Azederm** is indicated for dermatological use only and not for ophthalmic use.
- Use **Azederm** for the full-prescribed treatment period.
- Avoid the use of occlusive dressings or wrappings.
- Keep away from the mouth, eyes, and other mucous membranes. If **Azederm** comes into contact with the eyes, wash the eyes with large amounts of water and consult a physician if eye irritation persists.
- This drug should be used during pregnancy only if clearly needed.
- Caution should be exercised when it is administered to a nursing mother.
- Safety and effectiveness in pediatric patients less than 12 years of age have not been established.

Side effects:

- Pruritus, burning, stinging, tingling, and peeling were rarely reported.

Dosage and administration:

- After the skin is thoroughly washed and patted dry, a thin film of **Azederm** should be gently but thoroughly massaged into the effected areas twice daily, in the morning and evening.
- Hands should be washed following application.
- The duration of use can vary from person to person and depends on the severity of the acne.
- Improvement of the condition occurs in the majority of patients with inflammatory lesions within four weeks.

Storage Conditions:

- Don't freeze.
- Store at temperature between (15-30)°C.

Packaging:

- Aluminum tube containing 20 g of **Azederm Cream**.

* THIS IS A MEDICAMENT *

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

(Council of Arab Ministers)

(Union of Arab Pharmacists)

Mediotic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediatic.com - Homs - SYRIA - Tel: 2222160

أزیدرم
"كريم"

التركيب :

كل ١ غ من أزیدرم كريم يحوي ٢٠٠ ملغ أزيلانيك أسيد.

الخصائص :

أن حمض الأزيلانيك يعيد كيراتين الجلد إلى الوضع السوي إذ يقلل من سماكة الطبقة المتقرنة ، كما يقلل من حجم و عدد حبيبات الكرياتوهيالين .

الاستطبابات :

– يستعمل للمعالجة الموضعية للعد الشائع المتوسط الشدة .

مضادات الاستطباب :

له مضاد استطباب عند الأشخاص الذين أظهروا فرط تحسس لأي من مكونات المستحضر .

التحذيرات :

- أزیدرم مخصص للاستعمال الجلدي فقط و ليس للعينين .
- يجب استعمال أزیدرم كل الفترة الموصوفة للمعالجة .
- يجب تجنب استعمال أغطية .
- يجب أن يطبق بعيداً عن العين و الفم والأغشية المخاطية . إذا لاس أزیدرم العين يجب غسلها بكمية كبيرة من الماء، وفي حال حدوث تهيج للعين يجب استشارة الطبيب .
- لا يعطى أثناء الحمل إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى لذلك .
- يعطى بحذر عند المرضعات .
- لم يقرر استعماله عند المرضى تحت ١٢ سنة من العمر .

التأثيرات الجانبية :

نادراً ما يحدث حكة ، تحسس حرق ، وخز ، تقشر .

الجرعة و طريقة الاستعمال :

- بعد غسل الجلد و تجفيفه تطبق طبقة رقيقة من أزیدرم بلطف لكن بشكل كامل على المنطقة المصابة مرتان يومياً صباحاً و مساءً .
- يجب غسل الأيدي بعد الاستعمال مباشرة .
- مدة المعالجة تختلف من شخص لآخر و تعتمد على شدة الإصابة .
- يحصل التحسن في أغلب المرضى الذين لديهم آفات جلدية خلال أربعة أسابيع .

شروط الحفظ :

- لا يجمد .
- يحفظ في درجة حرارة بين (١٥-٣٠)°م
- يتوجب المنويوم يحتوي على ٢٠ غ من أزیدرم كريم .

التعبئة :

0763 Ed03 04/2024

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات بمركبه للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلي هما «خبران بالدواء» ويبلغه وصفه .
- لا تنقطع مدة العلاج المحددة لك من نشاء .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .
- (مجلس وزراء الصحة العرب)
- (اتحاد الصيدلة العرب)

مفبرات ميديوتيك للصناعات الدوائية

ص.ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف : ٢٢٢٢١٦٠٠