

ACECLOTIC (Coated Tablets)



Composition:

Each coated tablet contains 100 mg Aceclofenac.

Properties:

- Aceclofenac is a new synthetic non-steroidal product which has an important anti-rheumatic, analgesic, and anti-inflammatory activity.
- It inhibits the synthesis of prostaglandines, main mediators of inflammatory processes.

Indications:

- **Aceclotic** is indicated for the treatment of pain of different aetiology such as: odontalgia, post-traumatic tumeaction, lumbosclatica, myalgia, post-episiotomia pain, post-labour pain, primary dysmenorrhoea and extra-articular rheumatism.
- Due to its anti-inflammatory activity it is also indicated in chronic treatment of inflammatory cases such as: rheumatoid arthritis, ankylopletic spondylitis, arthrosis and scapulothumeral periarthritis.

Contraindications:

- This drug should not be taken if the patient is allergic to Aceclofenac or to drug of the same group (Diclofenac).
- As with other anti-inflammatory non-steroidal agents, it is contraindicated in asthmatic patients in which Acetylsalicylic acid and other inhibitory agents of synthetase prostaglandine cause access of asthma, urticaria or acute rhinitis.
- It should not be used in patients suffering from gastroduodenal ulcer in active phase.

Side effects:

- The reported side effects have usually been slight and transitory: epigastric pain, stomach-ache, vomiting, nausea, and sensation of fullness, occasionally skin rash, oedema, and rarely urticaria.
- Occasionally may arise headache, sensation of tiredness, drowsiness or dizziness as well as an increase of nocturnal diuresis.

Precautions:

- Patients suffering from gastrointestinal troubles or with a history of peptic ulcer should be kept under close observation.
- It should be used with special care in elderly patients or in patients under treatment with diuretics and/or in convalescent patients after surgical operations, as well as in patients under the effects of a severe hepatic, cardiac or renal lesion.

Warnings:

- Though the present data are insufficient, it is recommended not to use this drug during pregnancy or breast-feeding.
- As a measure of prudence, patients must refrain from driving or handling dangerous machinery, and must avoid situations requiring a special state of alertness.
- This drug is not to be taken in children under 7 years.

Drug Interactions:

Although there are no data concerning the interactions of this drug with others, it is convenient to inform the doctor if the patient is under treatment with other medicaments, especially if they contain lithium, digoxin, anticoagulants, oral administration antidiabetics, diuretics or any other anti-pain drug.

Dosage and administration:

- Treatment (number of tablets, number of intakes, and duration) should be established by the doctor.
- It is important that the patient follows doctor's instructions.
- Generally, the daily dose is of two tablets (200mg/day) divided into two intakes, 1 tablet every 12 hours.

Overdose:

- In case of a massive accidental intake, the patient should be treated according to symptoms, giving him medication against gastrointestinal irritation, hypotension, respiratory depression, and convulsions.

Package:

2 blisters each one contains 10 coated tablets / carton box

* THIS IS A MEDICAMENT *

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

(Council of Arab Ministers)

(Union of Arab Pharmacists)

Mediotic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediatic.com - Homs - SYRIA - Tel: 2222160



أسكلوتيك (مضغوطات ملبسة)

التوكيب:

كل مضغطة ملبسة تحتوي ١٠٠ ملغ أسكلوفيناك .

الخصائص:

- الأسكلوفيناك هو مركب صناعي جديد غير ستيرويدي يملك فعالية على قدر من الالتهاب كمتسكن ومضاد للتهاب ومضاد للروماتيزم .
- الية تأثيره تتظاهر بتنشيط اصطناع البروستاغلاندينات ، العامل الوسيط الأساسي في عمليات التهاب .

الاستعمالات:

- يستعمل أسكلوتيك لمعالجة الألم متعدد المصادر كما في الحالات التالية :
ألم الأسنان ، بعد إصابة أو تورم رضخي ، ألم العصب الوركي القطني (عرق النسا) ، ألم العضلات ، ألم ما بعد الولادة ، ألم المخاض ، عسر الملمح الأولي ، الروماتيزم المفصلي .
- ونظرا لخواصه المضادة للالتهاب يستعمل أيضا أسكلوتيك في المعالجة المزمعة لعدد من الحالات الالتهابية مثل :
• التهاب المفصل الروماتيزمي (الرثية الروماتيزمية) .
• التهاب الفقار القطني .
• الفصال و التهاب ما حول المفصل الكتفي العنقي .

مضادات الاستعجاب:

- التحسس للأسكلوفيناك أو لأحد أدوية المجموعة ذاتها (الديكلوفيناك) .
- كما في باقي مضادات التهاب غير الستيرويدية لا يعطى الدواء لمرضى الربو حيث إعطاء حمض الصفصاف أو أحد الأدوية المثبطة لاصطناع البروستاغلاندين تسبب تفاقم الربو ، الشرى أو التهاب أفك حاد .
- لا يعطى الدواء لمرضى القرحة المعدية الفعالة .

التأثيرات الجانبية:

- غالبا هي آثار خفيفة ومختلفة الطبيعة من شخص لآخر : ألم سرسفي ، ألم معدة ، غثيان ، إقياء ، حس التسخة ، طفح جلدي ، ودمة ، شرى في حالات نادرة .
- في حالات قليلة : صداع ، تعب ، دوار ، زيادة التبول الليلي .

الاحتياطات:

- المرضى الذين يعانون من مشاكل معدية معوية أو لديهم تاريخ قرحة معدية يجب أن تتم مراقبتهم عن كثب .
- يعطى الدواء بحذر في حالات المرضى المتقدمين بالسن ، المرضى الذين يتناولون المدرات ، المرضى في فترة النقاهة بعد العمليات الجراحية ، و المرضى الذين يعانون آفات كبدية أو كلوية أو قلبية شديدة .

التحذيرات:

- رغم عدم وجود معلومات كافية حول تأثيراته ، ينصح عدم استعمال الدواء أثناء الحمل والإرضاع .
- يجب تجنب القيادة أو تشغيل الآليات الثقيلة التي تتطلب الحذر عند تناول الدواء .
- لا يعطى للأطفال تحت عمر سبع سنوات .

التداخلات الدوائية:

على الرغم من عدم وجود معلومات كافية حول تداخلات دوائية للأسكلوفيناك مع غيره من الأدوية ، يجب إيلاء الطبيب في حال تناول دوية أخرى ، خاصة : الليثيوم ، الديجوكسين ، مضادات التخثر ، دوية السكر القوية ، المدرات أو أحد المسكنات .

الجرعة وطريقة الاستعمال:

- يجب أن يحدد الطبيب المعالج (الجرعة وطريقة الاستعمال و فترة الاستعمال) .
- يجب اتباع إرشادات الطبيب .
- عادة الجرعة اليومية ٢٠٠ ملغ مقسمة على دفتين ، أي تؤخذ مضغطة واحدة كل ١٢ ساعة .

تجاوز الجرعة:

في حال تناول كمية كبيرة خطأ ، تجري معالجة المريض تبعاً للأعراض ، فيمكن إعطاء دوية لعلاج التشنج المعدي المعوي ، هبوط الضغط ، الهبوط التنفسي والاختلاجات .

المعوية:

عليه من الكرتون تحوي ٢ شريط بلستر كل منها ١٠ مضغطة ملبسة.

0770 Ed02 12/2019

* هذا دواء *

- لاتترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
- ادواء مستعطر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات يعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال: مخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلي هما المختبران بالادواء وينتفع وضوء .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .
- (مجلس وزراء الصحة العرب)
- (الاتحاد الصيدالة العرب)

مختبرات ميديو تيك للصناعات الدوائية

ص.ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف ٢٢٢٢١٦٠