

# أكني-ستوب (كريم)

تربيتينونين (٢٠٢٠ - ٠٠٥٠ %)



تحوي الكريمة، ريزورسيتول أو حمض الصفاف مع المستحضر وينصح براحة لبشرة المريض حتى تحمد تأثيرات هذه المستحضرات قبل البدء باستعمال المستحضر.

يصنف المستحضر بالدرجة C من ناحية تأثيره على الجلد.

لا توجد دراسات كافية ومبنية على المرأة الحامل لذا يستخدم فقط عندما تفوق المنافع المحمولة المخاطر المبنية على الجنين.

**الارضاع:** لا يعرف فيما إذا كان يفرز في حليب الأم، ولأن كثيراً من الأدوية تطرح في حليب الأم، لذا يجبأخذ الحيوة والحذر عند استعماله عند المرضعات.

## الجرعة وطريقة الاستعمال:

يجب تطبيق الكريم مرة واحدة يومياً، تستعمل كمية كافية منه لغطية المنطقة المصابة بشكل خفيف.

خلال الأسابيع الأولى من العلاجية قد يظهر تفاقم لآفة التهابية وهذا يعزى إلى تأثير الدواء على الآفة المغيرة غير المرئية سلباً، ولا يتعين ببساطة قطع العلاجية.

التأثيرات العلاجية قد يجبر أن تلاحظ خلال ٣-٦ أسابيع وتطلب العلاجية أكثر من ٦ أسابيع لمشاهدة تأثيرات نافعة بشكل واضح.

عند حدوث الاستجابة المرضية للدواء قد يكون من المحمول المحافظة على التحسن بتوالى أقل للتطبيق أو استخدام إشكال جرعة أخرى.

يجب استخدام المستحضرات التجميلية عند المرضي العالجين لكن يجب أن تقتصر المنطقة المصابة بشكل كامل قبل التطبيق.

## فرط الجرعة:

إذا طبق الكريم على مساحة واسعة، فلن نحصل على نتائج أفضل، وقد يحصل احمرار وتقشر وازعاج. إن تناول هذا الدواء فموياً وحدهمه قد يؤدي لتأثيرات جانبية شديدة بتناول جرعة مفرطة قوية من الفيتامين A.

## ال副作用:

علىة من الكرتون تحوي توب فيه ٢٠ غ من الكريم.

## شروطحفظ:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة، من ١٥-٢٥ °م.

- الاستعمال الخارجي فقط.

-صرف بموجب وصفة طبية.

-يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

- لا يعطى المرأة الحامل.

## \* هذا دواء \*

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
- الدواء، مستحضر ينثر على الجلد، ويشمله حالات التهابية يعرض للخطر.
- لا يتعين بذرة وصفة طبيب وملف إدخال المتصور عليهما وعلويات الصيدلي الذي صرفها لها.
- لا يعطى للأطباء والصيدليات إلا بغير باردة، ويفتح فوراً.
- لا ينفع في حالة الحميدة لأنها من نقص نسب.
- لا تذكر صرف الدواء من دون وصفة طبية.
- مجلس وزراء الصحة العرب



## مفتاحات ميديتك للصناعات الدوائية

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٦٦٠

يجب أن يستخدم المستحضر للعلاجية بناء على وصفة الطبيب فقط وحسب تعليماته ولا يطبق على مذللو آخر من الجسم أو الأفاف، لم يتم تقييم فعالية وأمان العلاجية المطلوبة.

المستحضر لاستخدامه الموصى فقط.

**التركيب:** كل ٤ غ من الكريم يحتوي :

تربيتينونين، ٢٥ مل، أو ٥ مل (٥٠،٥٪).

**السواغات:** حمض الشمع، إيزوبروبيل ميرستات، إيموجين B2، بروبيلين غلوكول، كحول ستريليك، صمغ الكرانش، حمض السوربيك، بوتيل هيدروكسي تولوين، ماء منقى.

**التأثيرات الجانبية:**

يُنصح تربيتينون المطبق تمسك الخلايا الظهارية الجريبية وينقص تشكل الزوائن المكروبي، يبنيه الفعلة الانقسامية الخلايا الظهارية الجريبية، يزيد من تقلب الخلايا الظهارية الجريبية المتسيبة في انتزاع الزوائن.

**الاستطبابات:**

يُستخدم تربيتينون موضعياً لمعالجة:

- حب الشباب "العد الشائع".

- أنواع أخرى من حب الشباب (اندفاعات حب الشباب): حب الشباب الناجم عن الأدوية مثل الكروتيوكستروبروتينات، الباربيتونات، الخ...

- إدفار-أوكشو (التنكس المزن العقدي): داء جلدي من مصحوب باكياس وزوائن.

**مضادات الاستطبابات:**

يجب إيقاف الدواء في حال فرط الحساسية لأي من مكوناته.

**التحذيرات والاحتياطات:**

يجب إيقاف الدواء في حال الحساسية نحوه أو التهيج الكيميائي. يجب اغتصاص التعرض لأشعة الشمس بما فيها المصابيح المصممة خالل استعمال تربيتينون موضعياً. وفي حال كان الجلد يُعرض بعيدي من حرارة الشمس يجب أن ينصح بستعمال هذا الدواء حتى يشفى بشكل تام. ينصح باستخدام واقف الشمس أو الابلة الواقعية ضد عدم فقدانه عن تجنب آفة الشمس، كما أن الطقس الشهي مثل الريح والبرد قد يسبب التخريش للمريض المعالج بالمستحضر. يجب إبعاد تربيتينون عن العينين والفم وزوايا الأنف والأغشية المخاطية. تم الإبلاغ عن تخريش شديد على الجلد الأكزيمي لدى ينبعي أحد الحذر الشديد عند مؤلاء المرتضى.

**التأثيرات الجانبية:**

قد يصبح الجلد حمراء بشكل مفرط، ووذى، وذى نفطات. في حال حدوث ذلك يجب إيقاف العلاجية حتى عودة الجلد لحالته، أو يجب ضبط الجرعة الروائية بحيث يتحملها المريض. ينصح بعض القرارات حدوث فرط تمعن أو قصر نصفي أثناء تطبيق تربيتينون.

**التدالخات الدوائية:**

يجب الحذر عند استعمال المتزامن مع المستحضرات الجلدية، الصوابين الطبية، المنظفات الكاشطة أو الججميلية، التي تسبب تأثيرات مفعمة قوية، تحتوى تراكيز عالية من الكحول، التواب، المواد القابضية أو الاليم بسبب إمكانية التداخل الدوائي مع تربيتينون. يوحذ الحذر بشكل خاص عند استخدام مستحضرات