



# بيكلو رذاذ الأنف

**التركيب:**

- كل بخة تحتوي ٤٢ ميكروغرام بيكلوميتازون ديبروبيونات.
- عدد البخات في العبوة ١٢٠ بخة.

**الخصائص:**

- بيكلوميتازون ديبروبيونات المادة الفعالة في بيكلو رذاذ الأنف ، مضاد للتهاب ستيرويندي.
- يسبب مفعوله المضاد للالتهاب تقليل بيكلوميتازون ديبروبيونات من ذمة و تهيج الأنف ، وتساعد على زوال الأعراض المزعجة .

**الاستخدامات:**

- يستخدم بيكلو رذاذ الأنف في إزالة أعراض التهاب الأنف المومسي ، التهاب الأنف الدائمي سواء التحسسي أو غير التحسسي .
- يستخدم بيكلو رذاذ الأنف أيضاً لمنع تكاثر البوليليات الأنفية بعد استئصالها جراحياً ويستغرق العلاج عدة أسابيع أو أكثر للوصول إلى الشفاء التام .

**مضادات الاستقلاب:**

- التحسس لأي من مكونات بيكلو رذاذ الأنف .

**التحذيرات:**

- استبدال الستيروينيد القشرى الجهازى في بيكلو رذاذ الأنف يمكن أن يصحبه علامات قصور كظرية إضافة إلى بعض الأعراض مثل المغافل و / أو المضلات ، إنهاك و اكتئاب .
- المرضى الذين يعانون من الربو أو حالات سريرية تتطلب معالجة طويلة بالستيروينيد القشرى الجهازى يمكن أن يسبب الإنقاص السريع له تفاقم هذه الأعراض .
- الأطفال الذين يأخذون لوبية مثبطة للمناعة أكثر عرضة للإصابة بالإلتهابات من الأطفال الأصحاء . جري الماء و الحصبة مثلاً يمكن أن تكون خطيرة و حتى مبنية للأطفال الذين يتلقون الستيروينيدات القشرية بجرعات مثبطة للمناعة .

**الأثار الجانبية:**

- معظم الناس لا يعانون من أي مشاكل بعد استخدام بيكلو رذاذ الأنف .

- أكثر الآثار الجانبية شيوعاً هو تهيج الغشاء المخاطي للأنف .

- من الآثار الجانبية النادرة شري ، مفعح جلدي ، تشنج قصبي ، عطاس ، صداع ، غثيان ، رعاف ، تدمع العينين .

**زيادة الجرعة:**

- إذا استخدمن بيكلو رذاذ الأنف بجرعات مبالغة : يجب إيقاف الدواء تدريجياً تحت إشراف الطبيب .

**معلومات للمريض:**

- على المريض استخدام الدواء بانتظام و في الأوقات المحددة .

- على المريض استخدام الدواء حسب إرشادات الطبيب ولا يتتجاوز الجرعة المحددة له .

- على المريض مراجعة الطبيب : في حالة عدم التحسن ( عدم زوال الأعراض ) بعد ٣ أسابيع من المعالجة ، إذا تراجعت حالة المريض أو حدوث عطاس و تهيج الأنف .

**الحمل:**

- ليست هناك دراسات كافية حول استخدام الدواء لدى النساء الحوامل .

- يستخدم بيكلو رذاذ الأنف إذا كانت المنفعة المترقبة تبرر الخطير المحتمل على الجنين .

**الإضاعات:**

- ليست هناك دراسات كافية حول إن كان بيكلوميتازون ديبروبيونات يفرز في حليب الأم لا ، و حيث أن بقية الستيروينيدات تفرز في حليب الأم ، لذلك يجبأخذ الحذر عند تناول الأم المرضع بيكلو رذاذ الأنف .

**عد الأطفال:**

- الكورتيكوستيروينيدات قد تسبب تباطؤ النمو لدى الأطفال و المراهقين ، عند استخدام الرذاذ لمدة طويلة .

**الجرعة و طريقة الاستعمال:**

- الكبار و الأطفال الذين يبلغ عمرهم ١٢ عاماً وما فوق : ١ - ٢ بخة في كل فتحة أنف مرتين يومياً .

- الأطفال ٦ - ١٢ سنة : بخة واحدة في كل فتحة أنف مرتين يومياً ، المرضى الذين لا يستجيبون لهذه الجرعة يمكن أن تزداد إلى بخان في كل فتحة أنف .

- لا ينصح استخدامه لدى الأطفال دون السادسة من العمر .

- يستخدم بيكلو رذاذ الأنف وقتاً حتى يظهر مفعوله ، يجب أن يوضح ذلك للمريض حتى تضمن استمرار المريض في تناول الدواء .

- إن وجود أفرزات أنفية عزبة أو وجود نزنة في الشفاه المخاطي للأطفال يعيق من تناول الدواء إلى المنفذة المصابة ، لذلك ينصح بإعطاء المريض دواء مضيق لوعية الأنف خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعالجة بـ بيكلو رذاذ الأنف .

**الحفظ:**

- يحفظ بدرجة حرارة ١٥ - ٣٠ م .

- يحفظ بعيداً عن الضوء .

- يحفظ بعيداً عن درجات الحرارة المنخفضة ، لا يوضع في الثلاجة .

- توقف عن استعمال الرذاذ بعد ٣ أشهر من فتح العبوة لأول مرة .

**التبغ:**

- عبوة بلاستيكية سعة ٨ غ بيكلو رذاذ الأنف / علبة كرتون .

0763 02 09/2020

**\* هذا دواء \***

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .
- الدواء مستحسن يؤثر على صحتك واستهلاكه كخلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرحت لك .
- الطبيب والصيدلي هما المقربان بالدلو ، وبنفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من لقى ، نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .
- ( مجلس وزراء الصحة العرب )

**مختبرات ميديهتك للصناعات الدوائية**

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف : ٢٠٠٠