

Tetraderm - CREAM



Composition:

Each gram of *Tetraderm Cream* contains:

- Betamethasone (as valerate) 0.5 mg
- Gentamycin (as sulfate) 1.0 mg
- Tolnaftate 10 mg
- Clioquinol (Iodochlorhydroxyquin) 10 mg

Properties:

Tetraderm Cream is a group of multiactive materials such as:

- Betamethasone valerate which is an anti-inflammatory, antipruritic and vasoconstrictive agent.
- Gentamycin sulfate which is a wide-spectrum antibiotic.
- Tolnaftate which is a fungicidal agent.
- Clioquinol which is an antibacterial and anti-fungal agent.

Indications:

Tetraderm Cream is indicated for the treatment of inflammatory manifestations of corticosteroid-responsive dermatoses when complicated by secondary infection caused by the organisms sensitive to the components of this dermatological preparation or when the possibility of such infection is suspected, such as: greasy dermatitis, contact dermatitis, neurodermatitis, impetigo, follicular dermatitis, chronic eczema, and the pruritus caused by sensitive skin.

Side effects:

- Local adverse reactions reported with the use of topical corticosteroids especially under occlusive dressing, include: burning, itching, irritation, hypo pigmentation, hypertrichosis, secondary infection, and skin atrophy.
- Rash, irritation and hypersensitivity have been reported with the topical usage of gentamycin sulfate, clioquinol and rarely with tolnaftate.

Precautions:

- This medication should not be used in those patients with a history of sensitive reactions to any of its components.
- This medication should not be used in pregnant women in large amounts or for long period.
- Any of the side effects that are reported following systemic use of corticosteroids including adrenal suppression may also occur with topical corticosteroids especially in infants and children.
- Intracranial hypertension has been reported in children receiving topical corticosteroids include a bulging fontanelle, headaches, and bilateral papilledema. Manifestations of adrenal suppression in children have been reported.

Dosage and administration:

A thin film of *Tetraderm Cream* should be applied to cover completely the affected area two or three times daily or as prescribed by the physician.


Storage:

-Store at temperature between (15-30)°C

-Protect from light, Keep out of reach of children

Presentation:

Aluminum tube contains 20 gr. *Tetraderm* cream/carton box.



تتراديرم - كريم

التركيب :

- كل 1 غرام من تتراديرم كريم يحتوي :
- بيتاميتازون (شكّل فالبرات) 0,5 ملء
- جنتاميسين (بشكّل سلفات) 1 ملء
- سولفونات 10 ملء
- يودو كلور هيدروكسى كوبين (كليوكينول) 10 ملء

الخواص :

- تتراديرم كريم عبارة عن مجموعة من المواد الفعالة يدخل فيها :
- بيتاميتازون فالبرات كمضاد للالتهابات والحكة ، وعامل يبيض اللآلئ الدموية .
- جنتاميسين سلفات وهو مضاد حيوى واسع الطيف .
- سولفونات قاتل فطريات .
- يودو كلور هيدروكسى كوبين (كليوكينول) مضاد للبكتيريا والفطريات .

الاستطبابات :

يصف بالاستعمال تتراديرم لعلاج المظاهر الالتهابية المرفقة للاتهابات الجلد المستجيبة للكورتيكوسيرتونيدات وخصوصاً عندما تكون مصحوبة بالاتهابات التائية التي تسببها عصوبات متخصصة على المواد التي تدخل في تركيب تتراديرم كريم، أو عند الشك بامراضية حدوث مثل هذه الاتهابات ومنها: التهاب الجلد الدهني ، التهاب الجلد التامسي ، التهاب الجلد العصبي ، الحصص الجلدي والتقويم ، التهاب الاجرية ، الاكروما والحك الشائسي عن حساسية الجلد .

التأثيرات الجانبية :

- قد سجلت تأثيرات جانبية موضعية باستخدام الستيرونيدات الفضفخة خاصة عند استعمال ضمادات ملقة و تتضمن :
حرق ، حكة ، تقرير ، نقص تصبيح ، شعراوئية ، التهابات ثانوية ، ضمور الجلد .
- كما سجلت حالات طفح جلدي و تقرير و فرط حساسية عند استعمال الموضعى للجنتاميسين والكليوكينول وبشكل ثانى التلتفات

التحذيرات :

- لا يستعمل هذا الدواء للمرضى الذين يشكون من الحساسية لأحد العناصر المكونة له .
- لا يجب استعمال هذا الدواء بمقدار كبيرة من قبل العامل أو فرق طبولة .
- إن الآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج عن الاستعمال العام (الجهمازى) للكورتيكوسيرتونيدات والتي تتضمن تثبيط الكظر يمكن أن تحدث أيضاً باستعمال هذه المواد موضعياً وخصوصاً لدى الأطفال والرضع .
- لوحظ حدوث فرق تواتر داخل الحفف عند الأطفال الذين يتلقون سترونيدات الفضفخة الموضعية ويتضمن تورم الياقوخ والمصادر وندمة الحليمات بالجانبين ، كما تثير إلى حدوث مظاهر تثبيط كهفي في الأطفال .

الجرعة و طريقة الاستعمال :

تدهن المنطقة المصابة بطبقة رقيقة من تتراديرم (2 - 3) مرات يومياً او حسب رأي الطبيب .

شروط الحفظ :

- يحفظ في درجة حرارة بين (15-30)° م
- يحفظ بعيداً عن الضوء ، يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

التعنة :

علبة كرتون تحتوي ببابون المنيوم بحري ٢٠ غ تتراديرم كريم


0738 Ed04 04/2021

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .
- الدواء مستحضر يحتوى على حساسات وأسهلاكه ، خلاً من تلقيبات يعرضك للنفخ .
- تجنب بدة وفحة المفتب وطرقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصناديق الذي صرفها لك .
- المبوب والمسيحي مما يحير (بالدلم) ويفتحه وسرره .
- لا تخلط مدة العلاج المحددة لك من نعما ، نفنس .
- لا تذكر صرف الدواء من دوى وصفة صبية .
- (اتحاد الصيادلة العرب)

مفتريات ميديوتيك للصناعات الدوائية

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢١٦٠



Mediotoxic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediotoxic.com - Homs - SYRIA - Tel: 2222160

(Council of Arab Ministers)

(Union of Arab Pharmacists)