



توبليريك (أطفال- كبار)

أوكسيمومايزين ، غوافينيزين، باراسيتامول، صوديوم بنزوات
تحاميل



التعليق:

كل تحميلة (توبليريك كبار) تحتوي: أوكسيمومايزين ٦.٦ ملغ، باراسيتامول ١٣٣.٢ ملغ، غوافينيزين ١٣٣.٢ ملغ، صوديوم بنزوات ١٣٣.٢ ملغ.
كل تحميلة (توبليريك أطفال) تحتوي: أوكسيمومايزين ٣.٣ ملغ، باراسيتامول ٦٦.٦ ملغ، غوافينيزين ٦٦.٦ ملغ، صوديوم بنزوات ٦٦.٦ ملغ.

المواصفات:

زيت نباتي معالج:

الخصائص الدوائية:

هذا الدواء هو مشترك لأربع مواد: أوكسيمومايزين، مضاد للهستامين صناعي مع خصائص مضادة للحمال ومهدئة. غوافينيزين، مطهر للشعب الهوائية، يمنع الإفرازات القصبية ومفتحة.

باراسيتامول، خواص مسكنة وخافضة للحرارة، و صوديوم بنزوات، الذي يسبب إنتاج أمونيا أقل من الجسم. لذلك يستخدم لعلاج السعال من منشأ التهابي، تحسسي أو حتى إنتاني، ويمكن أن يترافق مع المضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب بالاعتماد على منشأ السعال.

الاستقطابات:

العلاج العرضي للسعال (مبهج، غير منتجة، تشنجي، جاف) المرتبط بالظروف التنفسية المختلفة.

مضادات الاستقطاب:

• الأطفال دون السنتين من العمر.

• يجب عدم إعطاه مع منتج آخر يحتوي على الباراسيتامول.

• يجب عدم إعطاه للمرضى الذين لديهم حساسية تجاه أي من المكونات.

• مريضة بأوكسيمومايزين: قصور في الجهاز التنفسي أو كانت الدرجة.

• مرتبط بأباراسيتامول: قصور كبدى خلوي.

• يتم إعطاء الطبيب إذا كان لدى المرضى مشاكل في الجهاز التنفسي أو مشاكل في الكبد أو داء السكري.

• الرضاعة الطبيعية.

• التفاعلات التحسسية.

التحذيرات والاحتياطات:

قبل البدء بالعلاج المضاد للسعال، فمن المناسب التحقق من أسباب السعال لتحديد الأسباب التي تتطلب العلاج بذاتها من بين أمور أخرى بشكل أساسي الربو، السرطان، علة داخل

القصبات،

• إذا استمر السعال بعد إعطاء مضاد للسعال في الجرعات المعتادة، فإنه لا يصح زيادة الجرعة، ولكن بإجراء إعادة نظر للحالة السريرية.

• يجب إعلام الطبيب عن المرض المتواجد مسبقاً، والتحسس والظروف الصحية الحالية.

• يجب أخذ الحذر عند إعطاء هذا الدواء لسائقي المركبات أو الآلات التي يحملن أن تكون خطرة بسبب خطر النعاس.

الحمل:

لم يتم إثبات سلامة هذا الدواء خلال فترة الحمل. لذلك، ينصح باستخدامه فقط بعد تقييم المخاطر إلى الوائد.

الاستخدام عند المسنين:

لا توجد تحذيرات خاصة وتوصيات بشأن الاستخدام السليم لهذا الدواء عند المرضى المسنين.

التفاعلات الدوائية:

• مريضة بأوكسيمومايزين: يجب تجنب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.

• يتم إعلام الطبيب عن أي أدوية يتناولها المريض، قبل البدء، أو أثناء العلاج.

• قد يحفز هذا الدواء الجهاز العصبي المركزي والاثروبينات المركزية، عندما يعطى بالمشاركة مع المواد المضادة للتشنج الكوليني الأخرى (مضادات الهيستامين الأخرى، إيمبرامين، الفينيثازين، مضاد الكوليك، مضادات القمل الكوليني، مضادات التشنج الأتروبيين و ديسوبراميد).

• قد يتداخل هذا الدواء مع الأدوية التالية: لوميتيدين، ميوسرين، كيتوكونازول، فلوكونازول، بروفينيدول، بروفينيدول، تيربوتولوميد.

• قد يتداخل هذا الدواء مع بعض الفحوصات المخبرية.

التأثيرات الجانبية:

• بشكل عام، يملك الجسم تحمل مرتفع تجاه هذا الدواء.

• حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة مع هذا الدواء.

• التأثير السلطاني الأكثر شيوعاً هو النعاس. بشكل نادر أكثر، إسهال واحتباس البول، تخطيط عظمي، وجفاف الدم، والآثار السلبية السعوية (بشكل خاص عدم التحمل الهضمي)، خلال الحركة

إذا حدث أي رد فعل غير سار أثناء العلاج، يتم إعلام الطبيب فوراً.

• استمر الطبيب في حال ملاحظة المرضي من الآثار الجانبية التالية: الآم في البطن، حركات رخوة، إقياء، طلع حاك جلد، طلع، شعور بالمرض، احمرار الجلد، ضيق النفس، تورم

ملاص الوجه، الطفح الشاذ في خلايا الدم، انخفاض خلايا الدم البيضاء، نخر أنبوبي كلوي حاد، خلال الدم، تغيرات في لون البشرة، برودة اليدين والقدمين، تخطيط، وجفاف الدم، حتى أو

عائتي، بشرة جافة، زيادة الجوع، زيادة العطش.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

• من أجل التحاميل ٦.٦ ملغ/ ١٣٣.٢ ملغ/ ١٣٣.٢ ملغ/ بنزوات ١٣٣.٢ ملغ:

• البالغين: تحميلة واحدة صباحاً ومساءً.

• من أجل التحاميل ٣.٣ ملغ/ ٦٦.٦ ملغ/ ٦٦.٦ ملغ/ ٦٦.٦ ملغ:

• الأطفال بعمر سنتين إلى ١٢ سنة من العمر: تحميلة واحدة ثلاث مرات يومياً.

• يجب الالتزام بجدول الجرعات وبمدة العلاج.

• التوقف عن العلاج: يجب عدم التوقف عن العلاج دون إيعاز الطبيب.

• في حال تزامن جرعة، يجب استخدامها فور الملاحظة. في حال كانت قريبة من وقت الجرعة التي تليها، يتم تحميلة الجرعة المنسية ويتابع جدول الجرعات. يجب عدم مضاعفة الجرعة

تعرض الجرعة المنسية.

فترة الجرعة:

مرتبط بأوكسيمومايزين: قد تتميز الصورة السريرية بالاكنتاب والغيوبة. العلاج عرضي والذي قد يكون ضرورياً للتفكي الاصطناعي ومضادات الاختلاج.

مرتبط بأباراسيتامول: تسبب الجرعة المقتة اختلاخل خلوي كبد، مع قابلية حدوث نخر كامل وغير عكوس. تظهر العلامات السريرية عادة خلال ال ٢٤ ساعة الأولى. يجب أن يتم العلاج في وحدة

مختصة.

شروط الحفظ: "يحفظ في درجة حرارة الغرفة بين (١٥-٣٠)°م،

"يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال".

التعبئة:

علبة من الكرتون تحوي ١٠ تحاميل من توبليريك كبار ضمن شريطي بلاستيكي.

علبة من الكرتون تحوي ١٠ تحاميل من توبليريك أطفال ضمن شريطي بلاستيكي.

0800 Ed01 08/2019

* هذا دواء *

- لا تشارك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
 - الدواء: مستحضر يوتر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات يعرضك للخطر.
 - اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
 - الطبيب والصيدلي هما الخياران بالدواء ويتبعه وفرو.
 - لا تقسم مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
 - لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية.
- (مجلس وزراء الصحة العرب)
(اتحاد الصيدالة العرب)

مفترات ميديو تيك للصناعات الدوائية

ص.ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٢١٦٠