



ديومازول (غسول)

كلوتريمازول + بيتاميتازون ديبروبيونات

التركيب:

كل ١ غ من الغسول يحتوي على: ١٠٠ ملغ كلوتريمازول و ٠٠٠٤٤٣ ملغ بيتاميتازون ديبروبيونات (ما يعادل ٠٠٥ ملغ من بيتاميتازون).

المواصفات: زيت الابران، غايلين، كحول سيتوستيريلي، ستيريث ٣٠، بروبيلين غليكول، فوسفات الصوديوم أحادية الأساس، مونوهيدرات، حمض الفوسفور، كحول بنزيلي، كمادة حافظة وماء مقطر.

آلية التأثير:

يعمل الكلوتريمازول كمضاد فطري أزولي بيتاميتازون ديبروبيونات هو ستيرونيد قشري، يلعب الستيروئيد القشري دوراً في الإشارات الخلوية، الوظيفة المناعية، الالتهاب و تنظيم البروتين. على أية حال، آلية العمل في معالجة سعة القدم، سعة الأرقام و سعة الجند غير معروفة.

الغرض الدوائي:

لم يتم دراسة الفعالية الجذري و الامتصاص الجهازى لكلوتريمازول و بيتاميتازون ديبروبيونات بعد التطبيق الموضعي للغسول. كمية الامتصاص عبر الجلد للستيروئيد القشري الموضعي تحدد بواسطة عدة عوامل، تتضمن السواغ، سلامة الحائل البشري، و استخدام الضماد الساد. يمكن أن تمتص الستيروئيدات القشرية الموضعية من خلال الجلد السليم. قد يزداد الامتصاص في حال الالتهاب و/ أو المرض الجلدي، كما أن الضماد الساد يزيد فعلياً من الامتصاص.

الاستخدامات:

يستلطف الغسول في المعالجة لإلتهاب سعة القدم، سعة الأرقام، و سعة الجندالتي سببها البشروية النخفية، الشعروية الدقائية، و الشعروية الحمراء لدى المرضى الذين يكون عمرهم ١٧ سنة و ما فوق .

مضادات الاستطباب:

فرط الحساسية للكلوتريمازول أو البيتاميتازون أو لأي من السواغات.

التأثيرات الجانبية:

قد يحدث تملل مطفح، ورممة، إلتان ثانوي .

التأثيرات الجانبية الشائعة عن الاستخدام الموضعي للستيروئيد القشري: حكة، تهيج، جفاف، التهاب الجريبات، فطراً الألتعار، طفح جلدي غدي الشكل، نقص التسلع، التهاب الجلد المحيط بالمف، التهاب الجلد التماسي، الأراجي، تعطين الجلد، مسامور الجلد، سطور، الخشخشة، وظففة عند العرق، مشابهة الشعيرات، توسع الشعيرات و تحسس.

التأثيرات الجانبية الشائعة عن الاستخدام الموضعي للكلوتريمازول: خضاشي، شعور لاذع، قرح، تقشير، ورممة، حكة، شرى و تهيج علم الجلد .

التحذيرات والاحتياطات:

التأثير على الجهاز الغدي الصغرى:

من الممكن أن يسبب كبت عكس في محور الوطاء-النخاسي -الكلطر مع احتمالية نقصور ستيرونيدى قشري سكري . هذه الحالة يمكن أن تحدث خلال أو بعد سحب الدواء من المعالجة.

قد تحدث مثلاًزمة كوشينغ وارتفاع سكر الدم بسبب التأثير الجهازى للستيروئيد القشري أثناء العلاج. العوامل التي تؤهب المريض لكبت محور الوطاء-النخاسي -الكلطر تتضمن استخدام ستيرونيدات عالية الفعالية، مساحات علاجية واسعة، استخدام مطول، استخدام ضماد ساد، تغير في الحائل الجلدي، فطراً كبدى، و العمر الصغير .

في حال تثبيط محور الوطاء -النخاسي -الكلطر يجب إيقاف الغسول بالتدريج و ذلك بإلصاق تكرار التطبيق أو استبداله بستيروئيد قشري أقل فعالية .

التهاب الجلد الحفائلي:

لا يوصى باستخدام الغسول في معالجة التهاب الجلد الحفائلي .

الاستخدام عند الأطفال:

لا ينصح باستخدامه للأطفال أقل من ١٧ سنة .

الحمل والإرضاع:

الحمل: التصنيف الحلمي C .

لا يوجد دراسات كافية و مضبوطة على المرأة الحامل. لذا يعطى فقط إذا كانت الفائدة المرجوة تفوق الخطر المحتمل على الجنين .

الإرضاع:

لأن العديد من الأدوية تفرز في حليب الأم، لذا يجب أخذ الحذر عند استخدامه لدى المرأة المرضع.

الاستخدام لدى كبار السن:

يجب أخذ الحذر عند استخدام المنتجات الموضعية الحاوية على الستيروئيد القشري على الجلد الرقيق .

الجرعة و طريقة الاستعمال:

لمعالجة سعة الجند أو سعة الأرقام:

ضع طبقة رقيقة من الغسول على منطقة الجلد المصابة مرتين باليوم لمدة أسبوع.

لا تستخدم أكثر من ٤٥ غ في الأسبوع، لا تستخدم مع ضماد ساد .

يجب إعادة النظر في التشخيص في حالة عدم التحسن السريري بعد أسبوع من المعالجة .

لا تستخدم لمدة تتجاوز الأسبوعين.

لمعالجة سعة القدم:

ذلك منطقة الجلد المصابة بلطف مع كمية مناسبة من الغسول مرتين في اليوم لمدة أسبوعين.

لا تستخدم أكثر من ٤٥ غرام في الأسبوع، لا تستخدم مع ضماد ساد .

يجب إعادة النظر في التشخيص في حالة عدم التحسن السريري بعد أسبوعين من المعالجة .

لا تستخدم لمدة تتجاوز ٤ أسابيع.

الغسول للاستخدام الموضعي فقط. لا يستخدم فمواً و لا عينياً و داخل المهبل .

شروط الحفظ: يحفظ بشكل قائم في درجة حرارة الغرفة بين (١٥-٣٠)°م، يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

“لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية.”

التعليق: علبة من ٣٠ كرتون تحوي عبوة بلاستيكية سعة ٣٠٠ مجهزة بغطاء بلاستيكي محكم.

0804 Ed01 10/2019

* هذا دواء *

- لاتترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .
- الدواء مستحضر يؤثر على صحته واستهلاكه خلافاً لتعليمات يعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلي هما المحبران بالدواء وبنفهم وضره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .
- (مجلس وزراء الصحة العرب)

مفتبرات ميديوتيك للصناعات الدوائية

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف : ٢٠٠٠ - ٢٢٣٣٦٦٠