



# Rheumatism-Stop Gel

## Non-Steroid Anti-Inflammatory N.S.A.I.



### Composition:

Each 1 gram contains Diclofenac diethylammonium salt 11.6 mg.

### Properties:

- **Rheumatism-Stop gel** contains Diclofenac, a Non-Steroid Anti-Inflammatory N.S.A.I., which is applied locally and affected percutaneously therefore it has two benefits:
  - High concentration of active substance on affected area.
  - To avoid the side effects of N.S.A.I. when it is taken orally or by rectum.
- **Rheumatism-Stop gel** decreases the inflammatory swelling and it is a good analgesic agent. **Rheumatism-Stop gel** is easy to apply, while, its white, creamy, and non-greasy preparation can penetrate into the skin and its aqueous-alcoholic base gives it a soothing and cooling effect.
- Studies assured that the concentration of the active substance in the inflamed area is higher than in the plasma, and that shows the preparation effectiveness.

### Indications:

- Traumatic inflammation in the ligaments, tendons, and joints, as sprain, strain, and bruises.
- Localized forms of soft-tissues, as, tendovaginitis, and shoulder hand syndrome.
- Localized rheumatic diseases as, osteoarthritis of the spine and peripheral joints.
- Periarthritis.

### Contraindications:

Hypersensitivity to Diclofenac or any other N.S.A.I. agents.

### Pregnancy & Lactation:

It is recommended to consult your physician prior to the use of this medication during pregnancy and lactation.

### Precautions:

- This medication should only be applied to intact skin, not to damaged skin or open wounds.
- This medication should not come into contact with the eyes or mucous membranes.
- Do not use this medication orally.

### Side effects:

- **Rheumatism-Stop gel** is generally well tolerated; pruritus, erythema, rash, or stinging may occasionally occur.
- If **Rheumatism-Stop gel** is applied to large areas for prolonged periods, the possibility of systemic reactions of N.S.A.I. may occur.

### Dosage and Administration:

- Depending on the size of painful area to be treated 3-4 g of **Rheumatism-Stop gel**, cherry to walnut- sized amount, should be applied 3-4 times daily to affected sites and gently rubbed in.
- **Rheumatism-Stop gel** can also be employed as an adjunct with other dosage forms of diclofenac.

### Storage:

Protect from heat (store below 25°C).

### Presentation:

Aluminum tube contains 40 g of **Rheumatism-Stop gel**.

#### \* THIS IS A MEDICAMENT \*

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

( Council of Arab Ministers )

( Union of Arab Pharmacists )

Mediotic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediotic.com - Homs - SYRIA - Tel: 2222160



# روماتيزم ستوب جل

## مضاد التهاب غير ستيروئيدي



التركيب :  
كل ١ غرام يحتوي على ديكلوفيناك دي أثيل أمونيوم ١١.٦ ملغم .  
الخواص :

- روماتيزم ستوب جل مستحضر يحتوي على الديكلوفيناك ، وهو مضاد التهاب غير ستيروئيدي (N.S.A.I.) (يطبق موضعياً وبثور عن طريق الجلد ، وبذلك يحقق فائدتين :
- الحصول على تركيز عالٍ للمادة الفعالة فوق المنطقة المصابة .
- التخلص من الآثار الجانبية لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية عندما تطهى عن طريق الفم أو حتى الشرج .
- روماتيزم ستوب جل يخفف التورم الالتهابي ، ويسكن بشكل جيد ، فالديكلوفيناك معروف الفعالية .
- روماتيزم ستوب جل حضر بطريقة تكون فيها سهل التثبيق ، سهل التلاقي حيث أن قوامه الأبيض الكريمي وغير الدهني يمكن أن ينفخ بسهولة إلى داخل الجلد ، فيزدobil مفعولاً ملطفاً ومبرداً ، بفضل قاعدته المائية - الكحولية .
- أكدت الدراسات أن تركيز المادة الفعالة في المنطقة المصابة أعلى من تركيزها في المصورة (البلازما) وهذا ما يؤكد فعالية المستحضر .

### الاستطبابات :

- الالتهاب الرضحي (الرضي) في الأوتار والأربطة والمفاصل ، مثل حالات الرثى والإجهاد والكلمة .
- الأشكال الموضعية للأنسجة الرخوة مثل التهاب الورت والغمد ومتلازمة المنكب واليد .
- الأمراض الرثوية التكيسية مثل الفصال العظمي في المفاصل المحاطية والعمود الفقري .
- اختلال ماء حول المفصل .

مضادات الاستطباب :  
فرط الحساسية للديكلوفيناك أو الأدوية المضادة للالتهاب غير ستيروئيدية الأخرى .  
الحمل والإرضاع :

يُنصح باستشارة الطبيب قبل استعمال هذا المستحضر أثناء فترة الحمل والإرضاع .  
التحذيرات :

- يجب أن يستخدم روماتيزم ستوب على سطح الجلد السليم فقط ، وليس على جروح الجلد أو الإصابات المفتوحة .
- يجب لا يلامس المينين أو الأغشية المخاطية .
- يجب أن يوخذ المستحضر عن طريق الفم .

### الآثار الجانبية :

- المستحضر جيد التحمل ، لكن قد تحدث حكة أو احمرار في الجلد أو طفح جلدي ، التهاب الجلد التماسي .
- عند التثبيق على مساحة واسعة ولمدة طويلة ، قد تحدث الأعراض الجهازية الجانبية لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية .

### الجرعة وطريقة الاستعمال :

- استخدام ٣ - ٤ غ من روماتيزم ستوب جل وذلك حسب حجم الموضع المؤلم الواجب معالجته ، (تنراوح هذه الكمية بين جهة الكفر و جهة العور ) ٣ - ٤ مرات يومياً على المنطقة المصابة و يفرك الدواء بليطف .
- كما يمكن استعمال روماتيزم ستوب جل كمعالجة مشاركة مع الأشكال الأخرى من الديكلوفيناك .

### التحذير :

يحفظ بعيداً عن الحرارة ( يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥°C ) .  
التبغة :

توب معدني سعة ٤ غ من روماتيزم ستوب جل .

0740 Ed03 09/2019

#### \* هذا دواء \*

- لا تترك الأدوية في متجر أيدى الأطفال .
- الادوية مستحضر يفرز من صحتك واسهلاكه خالفة للتعليمات يعرضك للخطر .
- اتى بدمقة وحشة الطيب وطريقة الاستعمال تخصيصها وتعليمات لصيادي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيادي كما الخبرين يادواه وينبهه ونحوه .
- لا تفتق سبة العلاج المحددة لك من لقائه نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .
- مجلس وزراء الصحة العرب ( اتحاد الصيادة العرب )

# مفتibrات ميديكيل للصناعات الدوائية

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٢١٦٠