

# SALICID OINTMENT



## ساليسيد مرهم

### Composition:

Each 1 gr of SALICID ointment contains 200mg of Salicylic acid.

### Properties:

SALICID ointment has certainly an effect to remove corns and warts in hands, feet and other parts of the body, because it contains the effective element which is salicylic acid.

### Indications:

SALICID ointment is indicated for the removal of corns and warts in hands, feet and other parts of the body.

### Side Effects:

It may be cause irritation and dermatitis.

### Cautions:

- Do not use SALICID ointment for a long period, or with high concentration, or on wide areas of the skin.
- Do not use this product on wounded or inflamed skin.
- Avoid contact with mouth, eyes, or mucous membranes.
- Use with caution in patients with peripheral circulatory failure or diabetics.

### Contraindications:

Sensitivity to the active substance (salicylic acid).

### Dosage & Administration:

It is preferred to use SALICID ointment directly after taking a shower or after keeping the feet in hot water for fifteen minutes.

#### • Corns' removal:

SALICID ointment should be applied on the corn only, and put over it a plaster, repeat this daily until the corn disappears, and throughout using, it is noticed that the corn becomes as sponge, it is better in this case to remove the soft parts with sterile and sharp instrument.

#### • Warts' removal:

Apply SALICID ointment on the affected area in the morning and the evening and covered it with plaster. Repeat this until the wart disappears, consequently wipe off the area with a piece of cotton wetted with alcohol while leaving it exposed to the air until the skin returns to its natural state.

### Storage:

Store at room temperature between (15-30)°C.

### Presentation:

Aluminum tube contains 10 g of SALICID ointment /Carton box.

#### \* THIS IS A MEDICAMENT \*

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

( Council of Arab Ministers )

( Union of Arab Pharmacists )

Mediotic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediatic.com - Homs - SYRIA - Tel:2222160



### التركيب :

كل ١ غ ساليسيد مرهم يحوي ٢٠٠ ملغ ساليسيليك أسيد

### الخواص :

إن مرهم ساليسيد له مفعول مؤكد لإزالة مسامير الأقدام و الثآليل في اليدين و القدمين و كافة أنحاء الجسم لاحتوائه عل المادة الفعالة ساليسيليك أسيد

### الاستطيات :

يستخدم ساليسيد مرهم لإزالة مسامير الأقدام و الثآليل في اليدين و القدمين و كافة أنحاء الجسم .

### التأثيرات الجانبية :

قد يسبب تخريش موضعي و التهاب الجلد .

### مضادات الاستطيات :

التحسس للمادة الفعالة ( ساليسيليك أسيد )

### التحذيرات :

- لا يستخدم لفترة طويلة أو بتركيز عالية أو على مناطق واسعة في الجسم .
- تجنب تطبيقه على جلد مجروح أو ملتهب .
- تجنب تماسه مع الفم و العيون أو الأغشية المخاطية .
- يستخدم بحذر في التهاب الأوردة عند المرضى بقصور الدوران المحيطي أو السكري .

### الجرعة و طريقة الاستعمال :

- يفضل استعمال ساليسيد مرهم بعد الحمام مباشرة أو بعد المغطس للقدمين في ماء ساخن لمدة ١٥ دقيقة .
- إزالة المسامير :  
يوضع قليل من ساليسيد مرهم فوق المسمار فقط و يوضع فوقه قطعة لاصقة ( بلاستر ) ، تكرر العملية كل يوم حتى يزول المسمار ، و خلال الاستعمال يلاحظ أن المسمار أصبح قوامه إسفنجياً و الأفضل في هذه الحالة إزالة الأقسام الرخوة بالة حادة معقمة .
- إزالة الثآليل :  
يوضع قسم من ساليسيد مرهم على مكان الإصابة صباحاً و مساءً و يغطي بقطعة لاصقة ( بلاستر ) تكرر العملية حتى اختفاء الثآليل و من ثم يمسح المكان بقطعة قطن مميلة بالكحول و يترك معرضاً للهواء حتى يعود الجلد لحالته الطبيعية .

### شروط الحفظ :

يحفظ بدرجة حرارة الغرفة بين (١٥-٣٠)°م.

### التعبئة :

علبة كرتون تحوي ثيوب ألمنيوم سعة ١٠ غ ساليسيد مرهم .

0741 Ed03 09/2021

#### \* هذا دواء \*

- لاتترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
  - الدواء، مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات بغيرهazard للخطر .
  - اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
  - الطبيب والصيدلي هما المختاران بالدواء، ويتنعه وصره .
  - لا تتعلم مدة العلاج المهددة لك من تلقاء نفسك .
  - لا تكرر صرف الدواء، من دون وصفة طبية .
- ( مجلس وزراء الصحة العرب )  
( الاتحاد الصيدلاني العرب )

مختبرات ميديوتيكا للصناعات الدوائية

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٢١٦٠