

# سيبروفيتامين



## التركيب :

كل ٥ مل سيبروفيتامين شراب تحوي :

سيبروفيتامين هيدروكلوريد .....	٤ ملغ
فيتامين ب ١ .....	٠,٦ ملغ
فيتامين ب ٢ .....	٠,٧٥ ملغ
فيتامين ب ٦ .....	٠,٦٧ ملغ
نياسيناميد .....	٦,٦٧ ملغ
فيتامين ث .....	٢١,٦٧ ملغ

## الخصائص :

- يعتبر سيبروفيتامين هيدروكلوريد مضاد لمستقبلات الهيستامين (H1) وللمستقبلات السيروتونين معاً .
- الفيتامين C ضروري لعملية اصطناع الكولاجين و المادة بين الخلوية .
- الفيتامين B1 ( الثيامين ) أنزيم مساعد ضروري لاستقلاب الكربوهيدرات .
- الفيتامين B2 ( الريبوفلافين ) ضروري لاستفادة من الطاقة المختزنة في الطعام .
- الفيتامين B6 ( البيريدوكسين ) ضروري لاستقلاب الحمض الأميني و الكربوهيدرات و الدسم ، و ضروري لاصطناع الهيموغلوبين .
- النياسيناميد يشكله الأنزيم NAD و NADP ضروري لنقل الإلكترونات في السلسلة التنفسية .

## الاستطبابات :

- سيبروفيتامين يستخدم في المعالجة العرضية للتفاعلات التحسسية بما فيها : الشرى ، الوذمة العروائية ، التهاب الأنف ، التهاب الملتحمة ، و الاضطرابات الجلدية المترافقة بحكة .
- يستخدم سيبروفيتامين كفاتح للشهية خاصة في حالات القهم العصبي ( فقدان الشهية العصبي المنشأ ) .
- مشاركة الفيتامينات مع السيبروفيتامين يفيد في وقاية أو معالجة عوز الفيتامينات .

## التأثيرات الجانبية لمضادات الهيستامين :

التأثيرات المضادة للمسكارين : جفاف الفم ، كثافة مفرزات المجرى التنفسي وضيق الصدر ، تشوش الرؤية ، مشاكل كلوية ، بطء في حركية الجهاز المعدي المعوي يؤدي إلى إمساك و قلنس معدي ، تؤدي الجرعات العالية إلى بطء قلب مبني يليه تسرع قلب لانظمي .

## زيادة الجرعة :

في البالغين يحدث تثبيط للجهاز العصبي المركزي يتظاهر بـ : نعاس ، غيبوبة ، اختلاجات و قد يتطور إلى فشل تنفسي أو هبوط قلبي وعائي .

## علاج تأثيرات زيادة الجرعة :

يجب إفراغ المعدة مباشرة ثم إعطاء الفحم الفعال .

## احتياطات مضادات الهيستامين :

- لا يعطى الدواء للرضع و حديثي الولادة خوفاً من التأثيرات مضادة المسكارين المتزايدة عليهم ، كما أن كبار السن أكثر عرضة للتأثر بها .
- يحذر المرضى لضرورة تجنب القيادة و تشغيل الآليات الثقيلة أثناء المعالجة ، كما يجب تجنب المشروبات الكحولية .

## التأثيرات الجانبية للفيتامينات و الاحتياطات :

- الجرعات العالية من الفيتامين C تسبب الإسهال و بعض الاضطرابات المعدية المعوية الأخرى ، بيئة حمضية و تشكل حصيات بولية من أوكزالات الكالسيوم .

## التداخلات الدوائية :

قد تزيد مضادات الهيستامين من التأثيرات المركنة لمثبطات الجهاز العصبي المركزي ، مثل : الكحول ، الباربيتورات ، المنومات ، مسكنات الألم الأفيونية ، المهدئات ، مضادات الذهان .

## الحمل و الإرضاع :

لا يعطى خلال الحمل و الإرضاع إلا باستشارة الطبيب .

## مضادات الإستطباب :

- تؤخذ مضادات الهيستامين بحذر في حالات : الزرق المغلق الزاوية ، الاحتباس البولي ، ضخامة البروستات ، انسداد البواب و الفج ، الربو ، الصرع ، الاضطرابات القلبية الوعائية الشديدة ، الاضطرابات الكبدية مع مثبطات المونامينوأكسيداز (MAOI) .

## الجرعة و طريقة الاستعمال :

- لا يعطى للأطفال دون السنتين من العمر
- **الأطفال ( ٢ - ٦ )** سنوات : ٢,٥ مل مرتين يومياً .
- **( ٧ - ١٤ )** سنة و **البالغين** : ٥ مل ثلاث مرات يومياً .
- فاتح للشهية : تؤخذ أدنى جرعة من مجال الجرعات لكل فئة فاتح للشهية .

**التعبئة :** علبة كرتون تحوي زجاجة سعة ١٠٠ مل سيبروفيتامين شراب .

**شروط الحفظ :** - يحفظ بدرجة حرارة أقل من ٣٠°م . - يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال .

0774 Ed04 02/2021

## \* هذا دواء \*

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .
- الدواء - مستحضر بؤذر عى صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك لخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء . وينبغي وعده .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .

( اتحاد الصيدادة العرب )

( مجلس وزراء الصحة العرب )

**مفترات ميديو تيك للصناعات الدوائية**

ص.ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف ٢٢٢٢١٦٠٠