



CYPROHEPTADINE

"Antihistamine and Antiserotonin"



سيبروهبتادين

مضاد للهستامين وللسيروتونين



Composition:

Tablets: Each **Cyproheptadine** tablet contains 4 mg **Cyproheptadine** HCL.
Syrup: Each 5 ml of **Cyproheptadine** contains 2 mg **Cyproheptadine** HCL.

Properties:

- **Cyproheptadine** is an anti H1 receptors and antiserotonin receptors.
- **Cyproheptadine** has sedative effects, in addition to its antiallergic and antipruritic properties.
- **Cyproheptadine** stops itching, so it prevents secondary infections.

Indications:

Cyproheptadine is used for the symptomatic relief of hypersensitivity reactions including:

- Skin disorders: dermatitis, eczema, dermatographia, neuroangio edema, skin infection, and chicken pox.
- Insect bites and stings.
- Hay fever, allergic rhinitis, and allergic conjunctivitis (seasonal type).
- Urticaria.
- Urogenital pruritus.
- Food and drug allergies.
- Migraine and vascular headache.

Side effects:

Dry mouth, epigastric discomfort, restlessness, nausea, drowsiness, and weight gain (**Cyproheptadine** is a good stimulant of appetite).

Contraindications:

- Hypersensitivity to **Cyproheptadine**.
- Lactation and pregnancy.
- Newborn and premature infants.
- Bronchial asthma, angle-closure glaucoma, urinary reaction, prostatic hypertrophy, and GI obstruction (stenosing peptic ulcer).

Drug interactions:

MAO inhibitors increase the activity of **Cyproheptadine**.

Cautions:

- Patient must not consume alcohol or any sedatives while taking this medication.
- The ability to drive or operate machinery may be impaired while taking this medication.
- Should be given with caution to children under 2 years of age.

Dosage & Administration:

- Adults: one tablet (3 - 4) times a day (max 8 tablets daily).
- Children: (7 - 14) years: one tablet 3 times a day (max 4 tablets daily).
one tablespoon 3 times a day.
- (2 - 6) years: one teaspoon 3 times a day (max 5-teaspoon daily).
- In migraine and vascular headache: give one tablet when necessary and it can be repeated after ½ hour.

Storage:

- Keep in temperature between (15-30)°C.
- Keep away from light and moisture .
- Keep out of reach of Children.

Presentation:

Tablets: 2 blisters each one contains 10 **Cyproheptadine** tablets / carton box.

Syrup: Glass bottle of 100 **Cyproheptadine** syrup / carton box.

* THIS IS A MEDICAMENT *

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

(Council of Arab Ministers)

(Union of Arab Pharmacists)

Mediotic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediottic.com - Homs - SYRIA - Tel: 2222160

التركيب:

- **المضغوطات:** كل مضغرة من سيبروهبتادين تحتوي على ٤ ملغ سيبروهبتادين هيدروكلوريد .
- **الشراب:** كل ٥ مل من شراب سيبروهبتادين يحتوي ٢ ملغ سيبروهبتادين هيدروكلوريد .

الخواص:

- سيبروهبتادين مضاد لمستقبلات الهيستامين (H1) وللمستقبلات السيروتونين معاً .
- يملك سيبروهبتادين تأثيرات مسكنة إضافية إلى كونه مضاداً للحساسية و الحكة بمختلف أشكالها .
- يوقف سيبروهبتادين الحكة الجلدية تماماً مما يقلل من احتمال حدوث تفاعلات ثانوية فوق الأفة الحاكّة .

الاستطبابات:

- يعطى في الحالات التي تتطلب التخلص من الحكة وحالات التحسس كما في :
- الاضطرابات الجلدية (إضافة إلى المعالجة النوعية) ، التهاب الجلد ، الأكزيما ، كتوبية الجلد ، الوذمة العرقية العصبية ،
- أخماج الجلد كجدري الماء .
- التحسس و الحكة الناجمان عن لدغ الحشرات .
- حالات التحسس الموسمي مثل حمى القش ، التهاب الأنف التحسسي ، التهاب المتحمّنة التحسسي .
- الشرى .
- الحكة البولية التناسلية .
- حالات فرط الحساسية الناجمة عن الأدوية أو الأطعمة .
- كما يفيد في حالات الشقيقة و الصداع الوعائي .

الأثار الجانبية:

جفاف الفم ، ارتفاع شرسوفي ، تملل ، غثيان ، غثاس ، زيادة الوزن (سيبروهبتادين ففتح جيد للشهية) .

موانع الاستعمال:

- فرط الحساسية لـ سيبروهبتادين .
- الحوامل و المرضعات .
- حديثي الولادة و الخدج .
- الربو القصبي ، الزرق المغلق الزاوية ، الانحباس البولي ، ضخامة المثانة ، وجود انسداد في الجهاز الهضمي كوجود قرحة هضمية مضيقّة .

التداخلات الدوائية:

لا يعطى مع مثبطات أنزيم الأوكسيداز أحادي الأمين MAOI لأنها تزيد من فعالية سيبروهبتادين .

التحذيرات:

- يحذر تناول الكحول أو ما شابه أثناء المعالجة بـ سيبروهبتادين .
- يجب عدم قيادة السيارة أو العمل على الآلات الخطرة أثناء المعالجة .
- يفضل عدم إعطائه للأطفال دون الستين من العمر .
- **الجرعة و طريقة الاستعمال:**
- الكبار : مضغرة (٣ - ٤) مرات يومياً ، (كجرعة عظمية ٨ مضغرات يومياً) .
- الصغار : (٧ - ١٤) سنة : مضغرة ثلاث مرات يومياً ، (كجرعة عظمية ٤ مضغرات يومياً) .
- (٢ - ٦) سنوات : ملعقة صغيرة من الشراب ثلاث مرات يومياً ، (كجرعة عظمية ٥ ملاعق صغيرة يومياً) .

- لعلاج الشقيقة و الصداع الوعائي : تعطى مضغرة عند اللزوم و يمكن أن تكرر بعد نصف ساعة .

شروط الحفظ:

- يحفظ في درجة حرارة بين (١٥ - ٣٠)°C.
- يحفظ بعيداً عن الضوء والرطوبة .
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال .

التعليمة:

- **المضغوطات:** علبة كرتون تحوي ٢ شريط بلستر كل شريط يحتوي ١٠ مضغرات سيبروهبتادين.
- **الشراب:** علبة كرتون تحوي زجاجة سعة ١٠٠ مل سيبروهبتادين شراب .

0720 Ed02 07/2019

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
- الأدوية متحضرة يؤثر على صحتك واستهلاكك خلافاً للتعليمات يعرّضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلي هما الخياران بأدواء ومنتفعه وحسره .
- لا تقم بمدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .
- (مجلس وزراء الصحة العرب) (الاتحاد الصيدالي العرب)

مختبرات ميديو تيك للصناعات الدوائية

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف ٢٢٢٢١٦٠