



# صوداميد (كيسول)

بيكاربونات الصوديوم ٥٠ مل

التركيب والمواصفات: تحوي كل كبسولة صوداميد على: ٥٠ مل بيكربونات الصوديوم.  
المواصفات: يكرو-كرباليتون ميلارون، سيفرات المغذويون.

الاستهلاك: شفط كبسولات صوداميد لحلها.

عمر الصيف: لا تستخدم كبسولات صوداميد لحلها.

الخصائص: الصفائح (الحالة التي تكون فيها سوائل وأنسجة الجسم عادة حاضنة)

التحذيرات: آخر طبلوك في حال استمرار الأعراض بعد تناول هذا الدواء.

يلاحظ بعدم عن تناول الأطفال.

مقدار الاستهلاك: لا تستخدم كبسولات صوداميد لحلها.

يجب توخي الدخول بشكل خاص عند استخدام كبسولات الصوديوم إذا:

كان لديك مشكلة بالكلى أو الكليتين.

كذلك تعلق من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل قلبية.

ارتفاع حمبة محددة المحتوى من الملح (صوديوم).

الالتفاف بالعمر.

التحذيلات الولائية:

آخر طبلوك أو الصيدلاني في حال كنت تتناول أي من الأدوية التالية:

مضادات حمبة أو مضادات طفول (مثل الريفياميسين، كيوكاربازول، تراسيكلين)

الفينورباربات (العلاج القلبي أو الاكتان).

المسترونيدات التقريرية (العلاج الترمي والانهاب أو ردود الفعل التحسسية)

النيلون (العلاج للأمراض الفاسدة)

الأسبرين.

الميغروتريكتين (البعض أنواع الأدواء، الصدفية أو التهاب المفاصل الروماتيزمي).

البيفيندين (العلاج اضطراب نظم القلب).

الإيفيردين (العلاج اضطرابات النوم).

الفينتين (السرير).

الكلوروفوك (القوليك والعلوي والعلوي والعلوي والعلوي والعلوي).

البيسلينين (القوليك والروماتيزم).

ديبيزول (العلاج تخفيف الماء المحيط بالاضطرابات التالية):

آخر طبلوك أو الصيدلاني في حال كنت تستخدم أو قد استخدمت مؤخراً أي أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية.

الحمل والرضاع: استشر الطبيب أو الصيدلاني في حال كنت حامل أو مرضع في الوقت الراهن أو تخطط للحمل أو للدورة بالإلقاء قبل استخدام هذا الدواء.

التأثير على القهوة والشوكولاتة: لا تؤثر بيكربونات الصوديوم على القهوة أو تشغيل الآلات.

التأثيرات المترتبة على الماء: تخفيف الماء المحيط بالاضطرابات التالية:

كفرة من الأدوية، غير معرفة من الأدوية، ولكن ليس عند جميع المرضى.

في حال حدثت لديك ما يلي، من بيكربونات الصوديوم تأثيرات غير مرغوبة ولكن ليس عند جميع المرضى:  
إذا حدثت لديك ردود فعل تحسسية (زورق الشفقة، الوجه أو الرقبة والتي تسبب معرية حادة في التنفس، ملقط جدي أو بري)

تغدر هذه تأثيرات جلدية طفيفة لكنها تدريجية، تخفيف علامة الحدوث، قد تختفي بعد يوم طبية عاجلة أو مشفى.

آخر طبلوك في حال حدثت لديك أي ماء يلي ولا تذكر من يضمه أيام:

الإمساك، الشعور بالغثيان، القيء، التهاب، وريح.

يمكن أن يحدث أيضاً ما يلي:

عد استخدام بيكربونات الصوديوم لمدة طويلة، تصبح سوائل وأنسجة الجسم كلية جدًا، تسمى هذه الحالة بالفالوس وينبغي أن تلاحظ ضعف بالعضلات أو تشنجم.

تحوي كبسولات بيكربونات الصوديوم كثافة كبيرة من الصوديوم والتي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم (النفخات بيكربونات الماء) في حال كان لديك سلامة متضمنة من النفخات بيكربونات الماء (النفخات بيكربونات الماء) فإن كبسولات بيكربونات الصوديوم يمكن أن تجعل الموضع أسوأ.

في حال حدثت هذه التأثيرات الجلدية أو في حال ذلك منها، يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

الجرعة وطريقة الاطعام:

البالغون: عمر البالغ: اعٽ خ (٤) كبسولات (١٠ كبسولات) تؤخذ عدد الحاجة.

الصغار والآباء: حسب إرشادات الطبيب.

كبار السن: إذا كنت مقدم بالسن يجب عليك استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الدواء و يجب أن تكون حذر باتباع تعليمات الطبيب.

الاطفال: لا يستخدم عند الأطفال.

لا تتناول أكثر من المرة الموصى بها.

يجب أن تتناول الكبسولات كثافة طولية دون انتشار الطبيب.

إذا وصف لك جرعة متضمنة من هذا الدواء ونسيت أن تتناول جرعة ما في وقتها المحدد، تتناولها حالما تذكر إلا إذا كانت قريبة من الجرعة التالية لها، لا تتناول جرعة مضاعفة لتجاوز الجرعة المنشية.

في حال فرط الحرارة، استشر الطبيب فوراً.

يمكن أن تسبب فرط الحرارة الدخان قصر في التنفس، ضعف عضلي، حركات غير مبنية للجسم وفقدان الوعي لفترات طويلة.

عليه من المكثرون تحوي بيكربونات عدد ٢، وكل بيكربونات يحوي ١٠ كبسولات.

شروط الحفظ:

يلاحظ في درجة حرارة الغرفة، (١٥ - ٣٠) °م.

0828 Ed01 05/2022

## \* هذا دواء \*

- لاتناول الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
- الدواء: مستحضر ي يؤثر على صحة وأسلوبها، خالداً للتلقيحات، يعرضه للخطر.
- أيام: العادة وصحة الطبيب، وطريقة الاستعمال تضمن علاجها وتعليمات الصيدلي الذي صرحت له.
- الطبيب والصيدلي هما الذين يداراً ويعملان.
- لا تقطع دماغ الحمدة ذلك لمن تناول، يحسن.
- لا تذكر صرف الدواء من دون وصفة طبية.
- ( مجلس وزراء الصحة العرب )

# مختبرات ميديه تيل للصناعات الدوائية

ص.ب: ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢١٦٠



# SODAMED (Capsule)

Sodium Bicarbonate 500 mg



**COMPOSITION AND EXCIPIENTS:** Each SODAMED capsule contains: 500 mg Sodium Bicarbonate.

Excipients: Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate.

**INDICATIONS:**

SODAMED capsules are used to treat:

-Indigestion

-Acidosis (a condition where the body fluids and tissues are usually acid).

**WARNINGS:**

Please talk to your doctor if your symptoms remain the same after taking this medicine.

Keep out of reach of children

**CONTRAINDICATIONS:**

Don't take sodium bicarbonate capsules if you are allergic to sodium bicarbonate or any of the other ingredients of this medicine.

Take special care with sodium bicarbonate if:

- you have had problems with your liver or kidneys.
- you suffer from high blood pressure or have suffered from heart problems.
- you are on a salt (sodium) restricted diet.
- you are elderly.

**DRUG INTERACTIONS:**

Tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following medicines:

-Antibiotics or antifungals (e.g. rifampicin, ketoconazole, tetracycline)

-Phenothiazines (to treat anxiety or depression).

-Corticosteroids (to treat swelling and inflammation or for allergic reactions).

-Lithium (for mental illness)

-Aspirin

-Methotrexate (for certain types of tumors, psoriasis or rheumatoid arthritis).

-Quinidine (to treat heart rhythm disorders)

-Ephedrine (to treat breathing problems).

-Phenytoin (for epilepsy)

-Chloroquine (to prevent or treat malaria).

-Penicillamine (for rheumatism).

-Dipyridamole (to prevent blood clots associated with heart problems)

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

**Pregnancy and lactation:**

If you currently are pregnant or breast-feeding or are planning to become pregnant or to start breast-feeding, speak to your doctor or pharmacist before taking this medicine.

**Driving and using machines:**

Sodium bicarbonate is not known to affect your ability to drive or operate machinery.

**UNDESIRABLE EFFECTS:**

Like all medicines, sodium bicarbonate capsules can cause undesirable effects, although not everybody gets them.

If the following happens, stop taking your medicine and tell your doctor immediately or go to the casualty department at your nearest hospital:

-you have an allergic reaction (swelling of the lips, face or neck leading to severe difficulty in breathing, skin rash or hives).

This is very serious but rare side effect. You may need urgent medical attention or hospitalization.

Tell your doctor if you suffer from any of the following for more than a few days:

Stomach pains, Feeling bloated, belching, wind

The following effects may also occur:

-If you use sodium bicarbonate for a long time, your body tissues and fluids may become too alkaline. This is called alkalosis and you may notice muscle weakness and cramps

-sodium bicarbonate capsules contains a lot of sodium, which could make your blood pressure go up or cause fluid accumulation in your body and lungs.

If you already have a low level of potassium in your blood (hypokalemia), sodium bicarbonate capsules may make this worse.

If you experience these effects or if you are worried about them, you should contact your doctor or pharmacist.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

Adult: Indigestion: 1g to 5g (2 to 10 capsules) taken when required.

Metabolic acidosis: as directed by your doctor.

Elderly:

If you are elderly you should consult your doctor before taking this medicine, and must be particularly careful to follow your doctor's instructions.

Children: not recommended.

Don't take more than prescribed dose.

Don't take the capsules for too long without seeing your doctor.

The capsules should be swallowed whole with a drink of water.

If you have been prescribed regular doses of this medicine, and you forget to take your dose at the correct time, take your dose as soon as you remember, unless it is nearly time to take the next one. Don't take a double dose to make up for a forgotten dose.

**OVER DOSE:**

In case of overdose, consult your doctor immediately.

A severe overdose is likely to cause shortness of breath, muscle weakness, uncontrolled shaking of body and prolonged unconsciousness.

**PACKAGING:**

2 blisters, each contains 10 capsules/carton box.

**STORAGE CONDITION:**

Store at room temperature, (15-30) °C.

**\* THIS IS A MEDICAMENT \***

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of this leaflet when taking the medicine.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

( Council of Arab Ministers )

( Union of Arab Pharmacists )



Mediotic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediobic.com - Homs - SYRIA - Tel: 2222160