



# غريبادول (شراب)



باراسيتامول ١٢٥ ملغ، فينيل ايفرين هيدروكلورايد ٢٥٠ ملغ، غوافينيزين ٥٠ ملغ / ٥ مل

## التركيب والمواد:

كل ٥ مل شراب يحوي:

باراسيتامول ١٢٥ ملغ، فينيل ايفرين هيدروكلورايد ٢٥٠ ملغ، غوافينيزين ٥٠ ملغ.  
المواد: سوربيتول ٧٠٪، غليسرين ٢٩٦، كحول ٧٩٦، بروبيلين غليكول، سكارين الصوديوم، ايسوبولام بوتاسيوم، ستيرات الصوديوم، صمغ الكزانثان، حمض الليمون احادي الماء، منكه النعناع، اصفر غروب الشمس، ملون ازرق، ماء منقى.

## الخصائص:

يعد الباراسيتامول مسكن وخافض للحرارة.

يعد الغوافينيزين مضطحا.

يعد الفينيل ايفرين هيدروكلورايد مضاد للاحتقان محاكى للودي.

## الجرعات الدوائية:

يتمس الباراسيتامول بسرعة من الجهاز المعدي المعوي، يستقلب في الكبد ويخرج في البول.

يتمس الغوافينيزين بسرعة بعد الامعاء المعوي، يستقلب بسرعة ويخرج في البول.

يتمس الفينيل ايفرين هيدروكلورايد بشكل غير منتظم من الجهاز المعدي المعوي، ويخضع لاستقلاب العبور الاول بواسطة البروتين امين اوكسيداز في الامعاء والكبد. يملك الفينيل ايفرين المعطى فوريا حيويا منخفضا، يطر في البول بشكل كامل تقريبا.

## الاحتياطات:

التحذير: قصور الكلى: مع أعراض الزكام، القشعريرة والطفح الجلدي بما في ذلك العمل الصدري.

## مضادات الاستجابة:

• فرط الحساسية للباراسيتامول وآلي المكونات الأخرى.

• الاستخدام المتزامن لمضادات الاحتقان المحاكية للودي الأخرى.

• زرق العين.

• الإعتلال الكليدي أو الكلوي الشديد، ارتفاع ضغط الدم، فرط الدرقية، داء السكري، مرض قلبي أو عند الذئب يتناولون مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة أو الأدوية المضطربة للنبض والعرضى الذين يتناولون أو تناولوا خلال الأسبوعين الماضيين، مثبثات منو امين اوكسيداز.

• الأطفال تحت ٦ سنوات من العمر.

## التحذيرات والاحتياطات:

• يجب ألا تتجاوز مدة العلاج ١٠ أيام.

• ينصح بالحد من إعطاء الباراسيتامول لمرضى الاعتلال الكليدي الشديد أو الكلوي الشديد. مخاطر فرط الجرعة أكبر مع المسنين بمرض كبدى كحولي (غير شائع).

• يجب استشارة الطبيب قبل تناول دواء من قبل المرضى الذين يعانون من معال مزمن أو الربو.

• يجب على المرضى التوقف عن استخدام الدواء واستشارة أخصائي رعاية صحية إذا استمر العمل لأكثر من ٥ أيام أو في حال عودته أو ترقاق مع صبي أو صداع مستمر.

• يجب الحصول على الاستشارة الطبية قبل تناول هذا الدواء عند المرضى الذين يعانون من هذه الحالات:

• نقص غدة البروستات

• مرض وعائي ارشادي (مثل: داء رينو)

• مرض قلبي أو كلوي

• يجب عدم استخدام هذا المستحضر من قبل المرضى الذين يتناولون المحاكيات الودية الأخرى (مثل مضادات الاحتقان، مثبطات الشهية، المنبهات النفسية المشابهة للأفيون).

• يجب تجنب الاستخدام المتزامن للمستحضرات الأخرى التي تحتوي على الباراسيتامول. إذا استمرت الأعراض يجب استشارة الطبيب.

• يجب عدم استخدامه مع مستحضرات الأنف، الزكام أو مضادات الاحتقان الأخرى أو مثبطات السعال.

## التفاعلات الدوائية:

• إذا تم جمع البول خلال ٢٤ ساعة من تناول جرعة من هذا المستحضر، قد يحدث أحد التسلسلات تداخلًا لولياً مع فادرات الأحمية ٥-هيدروكسي اندول أسيتيك أسيد (5-HIAA) وفانيل مانتليك أسيد (VMA).

## باراسيتامول:

• هو مخزن التأثير المضاد للتشنج للورافارين والكورمانات الأخرى عن طريق الاستخدام المنتظم لفترات طويلة للباراسيتامول مع ازدياد خطر التليف. الجرعات المتفاوتة من أجل لأخر ليس لها تأثير كبير.

• قد تتعزز السمية الكبدية للباراسيتامول بالإفراط في تناول الكحول.

• يمكن زيادة سرعة امتصاص الباراسيتامول بالميتوكينولاميد أو النوبيريدون ويخفض الامتصاص بالكوليسترامين.

## فينيل ايفرين:

• يجب أن يستخدم بحذر بالمشاركة مع الأدوية التالية لأنه تم الإبلاغ عن تداخلات:

• مثبطات منو امين اوكسيداز: تحدث تفاعلات ارتفاع ضغط الدم بين الأمينات المحاكية للودي مثل الفينيل ايفرين

• ومثبثات منو امين اوكسيداز.

• الأمينات المحاكية للودي: يمكن أن يزيد الاستخدام المتزامن لفينيل ايفرين مع الأمينات المحاكية للودي الأخرى من خطر الآثار الجانبية القلبية العروية.

• حاصرات بيتا وخافضات الضغط الأدرين: قد يخفض الفينيل ايفرين من فعالية الأدوية الحاصرة لبيتا والأدوية الخافضة للضغط. قد تزداد مخاطر ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الآثار الجانبية القلبية العروية.

• مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة: قد تزيد من خطر الآثار الجانبية القلبية العروية مع الفينيل ايفرين.

• فلويدات الارغوت (الإرغوتامين وميثيل سرجيد): يزداد خطر التسمم بالقلب أو الوذات القلبية.

• الديجوكسين والمليوكريزات القلبية: يزداد خطر عدم انتظام ضربات القلب أو الوذات القلبية.

## العمل والإرشاد:

• يجب عدم استخدام هذا المستحضر خلال فترة الحمل دون استشارة طبية. لم يتم إثبات أمان الغوافينيزين والفينيل ايفرين خلال فترة الحمل.

• بغز الباراسيتامول والفينيل ايفرين في حليب الثدي ولكن ليس بكميات هامة سريريا. يجب عدم استخدام هذا المستحضر

## الآثار على القرى على القيادة واستخدام الآلات:

• يجب نصح المرضى بعدم قيادة السيارة أو تشغيل الآلات إذا كان مصابا بالدوخة.

## التأثيرات الجانبية:

• **الباراسيتامول:** تُعز آثار لمعطيات التجارب السريرية المحدودة، واثرة هذه الأحداث السلبية ليست معروفة، الأحداث التالية مشتقة من التجارب ما بعد التسويق الواسعة الجرعة العلاجية الموصوفة: قلة الصفائح، دثرة المحييات، تآكل، تفاعلات طية الحساسية الجلدية بما في ذلك (الطفح الجلدي، الوذمة الوعائية ومتلازمة ستيفن جونسون، تضرر الأنسجة القشورية السمي التحفري، تشنج العضلات (كذلك حالات تشنج عضلي مع الباراسيتامول ولكنها محتملة أكثر عند مرضى الربو المستعسين ولأسبرين أو مضادات التهاب غير الستيرويدية الأخرى)، خلل الوظيفية الكبدية، التهاب البنكرياس الحاد.

• **فينيل ايفرين:** لوحظت السلبية التالية في التجارب السريرية وقد تمثل الأحداث السلبية التي تحدث والأكثر شيوعا: عصبية، تهيج، اضطراب، استنارة، صداع، دوخة، آرق، زيادة ضغط الدم، غثيان، إقياء، إسهال.

• **غوافينيزين:** في آثار الآثار التالية غير معروف ولكن تعتبر من المرجح أن تكون نادرة: تفاعلات تحسسية، وذمة وعائية، ردود فعل تائية، ضيق النفس، الغثيان، الإقياء، انزعاج بطني، طفح، شرى.

## الجرعة والاستخدام:

• يجب ألا تتجاوز مدة العلاج ١٠ أيام.

• **الباراسيتامول:** ١٢٥ ملغ، فينيل ايفرين هيدروكلورايد ٢٥٠ ملغ، غوافينيزين ٥٠ ملغ / ٥ مل.

• **الطبيون:** الأطفال بعد ١٢ سنة وأكثر: أربع ملاق ٥ مل. تكرار كل أربع ساعات عند الضرورة. بحيث لا تتجاوز أربع جرعات في ال ٢٤ ساعة.

• **الأطفال:** بعد ١٢ - ١٤ سنة من العمر: يجب عدم إعطائه إلا عند المشورة الطبية.

• **الأطفال:** تحت ٦ سنوات من العمر: مضاد استباب.

• **المسنين:** يمكن تناول جرعة البالغين الطبيعية.

## طرق الجرعة:

• يجب الحصول على المشورة الطبية الفورية في حالة فرط الجرعة، بسبب خطر تلف الكبد الخطير المتأخر.

• **الباراسيتامول:** تلف الكبد ممكن الحدوث عند البالغين الذين تناولو ١٠ غ أو أكثر من الباراسيتامول. ابتلاع ٥ غ أو أكثر من الباراسيتامول قد يؤدي إلى تلف الكبد إذا كان المريض يعاني من عوامل محطورة (إذا كان المريض يعاني لمدى طويلة ب (الكازيمازين)، الفينوريبون، الفينوتيزين، بريمويد، ريفامبين، عتمة القصب جون أو الأدوية الأخرى التي تعثر الزيمات الكبد)، إذا كان يستهلك كميات زائدة عن الموصى بها من الإيثانول أو من المرجح أن يكون مستنفذ الجلوتاثيون مثل اضطراب الأكل، التليف الكبسي، الإصابة بفورس نقص المناعة المكتسب، المجاعات، دنف).

• أعراض فرط الجرعة: غثاس، القيء، إقياء، فقدان الشهية وآلم بطني. قد يصبح

• تلف الكبد واضع بعد ١٢ إلى ٤٨ ساعة من الابتلاع في حالات التسمم الحاد، قد يتطور فشل الكبد إلى اعتلال دماغي

• ونزف، نقص سكر الدم، وذمة دماغية وموت.

• قد يحدث فشل كلوي حاد مع تضرر كبلي حاد يتمثل بشدة بالألم القطني، بيلة دموية، بيلة بروتينية حتى في غياب التلف

• الكبدى الشديد. سجلت حالات من اضطراب القلب والتهاب البنكرياس.

• العلاج الفوري ضروري في تدبير فرط جرعة الباراسيتامول. على الرغم من عدم وجود أعراض مبكرة هامة، يجب

• على المرضى اللجوء إلى المستشفى على وجه السرعة للعناية الطبية الفورية. قد تكون الأعراض محدودة وربما لا

• تعكس شدة فرط الجرعة أو خطر تلف العضو. يجب الأخذ بعين الاعتبار المعالجة بالحمض الفول قبل أن تتناول فرط الجرعة

• خلال ساعة يمكن استخدام العلاج بـ ن أسيتيل ميسيتين خلال ٢٤ ساعة بعد تناول الباراسيتامول. فعالية الترياق

• تنخفض بشكل حاد بعد ٨ ساعات.

• **فينيل ايفرين:** من المحتمل أن يؤدي فرط جرعة الفينيل ايفرين إلى آثار مشابهة لتلك المذكورة في التأثيرات الجانبية.

• قد تتضمن الأعراض الإضافية ارتفاع ضغط الدم ونبض القلب العكاسي. في الحالات الشديدة قد يحدث: تخليط، هلوسة

• اختلاجات واضطراب النظم القلبية.

• يجب أن يكون العلاج ملائم سريريا. قد يحتاج ارتفاع ضغط الدم الشديد أن يعالج بالأدوية الحاصرة لآلفا مثل:

• الفينوتلانين.

• غوافينيزين: تسبب الجرعات الكبيرة جداً من الغوافينيزين الغثيان والإقياء. يعالج الإقياء عن طريق تعويض السوائل

• ومعالجة درجة الحرارة.

## شروط الحفظ:

• يحفظ في درجة حرارة الغرفة، (١٥-٢٥) °.

## التعليق:

• علبة من الكرتون تحوي عبوة زجاجية سعة ١٠٠ مل، مع كوب بلاستيكي عياري.

0815 Ed01 27/10/2020

## \* هذا دواء \*

• لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

• الدواء: مستحضر يؤثر على حركته واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .

• اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاعتدال استعمال الدواء عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

• الطبيب والصيدلي هما الحقيان بالدواء وبقوته وضرره.

• لا تتلق دواء العلاج لحدوثه لك: نفاذ .

• لا تأخر صرف الدواء من دون وصفة طبية .

• ( مجلس وزراء الصحة العرب )

مفبرات مديويتك للصاعات الدوائية

ص.ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف : ٢٠٠٠