

Glycerol Mediotic

Suppository (Adults – Children)



Composition:

Each Suppository of **Glycerol Mediotic CHILDREN** contains 1.3 g of glycerin.
Each Suppository of **Glycerol Mediotic ADULTS** contains 2 g of glycerin.

Excipients: Stearic acid - Sodium hydroxide - Deionized water

Mechanism of action:

Glycerin is classified as an osmotic laxative.

Glycerin by the rectal route promotes peristalsis and evacuation of the bowel by virtue of its irritant action and by increasing the amount of fluid, making it easier for stools to pass.

Indications:

For relieves occasional constipation.

Contraindications:

- Hypersensitivity to the active substance or to the excipients.
- If there is intestinal obstruction or blockage.
- If the patient have undiagnosed abdominal pain

Dosage and administrations:

- For rectal use only

- Wash your hands before and after using glycerin suppositories.

- If the suppository is too soft to use, put it in the refrigerator for about 15 minutes or run cold water over it.
- The suppository need not melt to produce laxative action.
- The suppository should be inserted well into the rectum and retained for 15 minutes.

- It generally produces bowel movement in 1/4 to 1 hour.

For 1-3g:

Children 2 - 6 years of age: 1 suppository daily or as directed by a doctor.

Children under 2: ask a doctor.

For 2g:

Adults and children 6 years and over: 1 suppository per day or as directed by a doctor

Children 2 - 6 years: use Child Suppositories.

PREGNANCY and lactation:

No evidence of harmful effects available. However, all medicines should be avoided if possible during pregnancy and lactation. Use only under a doctor's instruction in these conditions.

Side effects:

common side effects: Anal irritation; burning sensation; diarrhea; gases; nausea; stomach cramps.

Severe side effects: Severe allergic reactions, rectal bleeding.

Warnings:

- Its use should be stopped and ask the doctor if the patient have rectal bleeding or fail to have a bowel movement after using a laxative, this may indicate a serious condition.
- Prolonged or excessive use of the product is not recommended as this may cause diarrhea.
- Use of this product may interfere with glucose control in diabetic patients.
- Consult the doctor: If symptoms persist or if the symptoms do not improve after use or if they become worse.
- The doctor should be asked before use: if the patient noticed a sudden change in bowel habits that persists over a period of two weeks, if the patient experiencing nausea, vomiting, or abdominal pain Or if the patient is already used a laxative for more than 1 week
- It should not be used for longer than 1 week without checking with the doctor.

Overdose:

If the product is accidentally swallowed it is unlikely to cause effects. Accidental ingestion of a large number of suppositories may cause headache, nausea and vomiting less frequently diarrhea, thirst, dizziness, mental confusion and cardiac arrhythmias can occur. If swallowed, medical help should be sought right away.

Storage Instructions:

Store at temperature between 15 - 30°C

Keep out of reach of Children.

Presentation:

Carton Box contains plastic blisters with 10 **Glycerol Mediotic** Children suppositories .

Carton Box contains plastic blisters with 10 **Glycerol Mediotic** Adults suppositories .

* THIS IS A MEDICAMENT *

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

(Council of Arab Ministers)

(Union of Arab Pharmacists)



Mediotic Labs Pharmaceutical Industries

www.meditotic.com - Homs - SYRIA - Tel:2222160



غليسيرول ميديوتيك

تحاميل (بالقىن - أطفال)

التركيب :

كل تحاميلة **غليسيرول ميديوتيك** أطفال تحتوي ١٣ غ غليسيرين.

كل تحاميلة **غليسيرول ميديوتيك** بالقىن تحتوي ٢ غ غليسيرين.

المواد الغذائية : جصى الشمع - هيدروكسيد الصوديوم - ماء متزوج الشوارد

آلية التأثير:

يصنف الغليسرين كملين تناقضى.

يصنف الغليسرين عن طريق المستقيم التمعج وإخلاء الأمعاء وذلك تأثيره المهيج وزيادة كمية السوائل، مما يسهل مرور البراز.

الاستخدامات:

لتحفيض الإمساك العرضي.

مقدار الاستعمال:

- فرط الحساسية لل المادة الفعالة أو تجاه المساواغات.

- في حال وجود انسداد معوي أو إصغار.

- إذا كان المريض يعاني من الم بطئ غير مشخص.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

- الاستخدام من طريق المستقيم فقط

- تصلب البنين قبل وبعد استخدام تحاميل الغليسرين.

- في حال كانت التمهيلية طرية جدا عند الاستخدام، توضع في الثلاجة لمدة ١٥ دقيقة أو يمرر الماء البارد عليها.

- يجب أن تنصهر الجelly في تعطلي المسهل.

- يجب إدخال التمهيلية بشكل جيد في المستقيم وبقاءها لمدة ١٥ دقيقة.

من أجل دفع حركة الأمعاء خلال ١٤ ساعة على أقصى

الأطفال من ٦-٧ سنوات من العمر: تحاميل واحدة يوميا أو حسب تعليمات الطبيب.

من أجل غ:

البنين والبنات بعمر ٦ سنوات وما فوق: تحاميل واحدة يوميا أو حسب تعليمات الطبيب.

الأطفال من ٦-٧ سنوات من العمر: تستخدم تحاميل الأطفال.

العمل والاضطراب:

لا يوجد دليل تجاه على آثار ضارة على الرغم من ذلك ، يجب تجنب جميع الأدوية خلال فترة الحمل والإرضاع إذا أمكن. تستخدم فقط بموجب تعليمات الطبيب في مثل هذه الظروف.

الأثار الجانبية:

الأثار الجانبية الشديدة: تهيج شرجي ، شعور بالحرارة، تهيج شرجي ، عيالات، غازات، غثيان، مucus معدني.

التحذيرات:

- يجب إيقاف الاستخدام و استشارة الطبيب في حال كان المريض يعاني من نزف في المستقيم أو فشل في الحصول على حركة

في الأمعاء بعد استخدام الملين، هذا قد يشير إلى وجود حالة خطيرة.

- لا ينصح باستخدام هذه المساحق مع التكميم بالطلوكر عند مرضي المسكر.

- استشر الطبيب: في حال استمرار الأعراض أو في حال عدم تحسن الأعراض بعد استخدامها أو إذا أصبحت أسوأ

- يجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام: في حال لاظهار المريض حدوث تغير مفاجئ متصفر في عادات الأمعاء خلال أسبوعين، إذا كان المريض يعاني من الغثيان ، الإقياء أو الم بطئ أو في حال استخدام المريض لملين بشكل مسيق و لاكثر من أسبوع.

موجب عدم استخدام لفترة أطول من أسبوع دون استشارة الطبيب.

فترط البرءة:

في حال ابتلاء المساحق عن طريق الخطأ من غير المرجح أن يتسبب بحدوث آثار الإبتلاء العرضي لعدد كبير من التحاميل قد يسبب

الإبتلاء: في حال عدم تحسن الأعراض الطفيف على الفور.

شروط الحفظ:

- يحفظ في درجة حرارة بين ١٥-٣٠°C

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

: التهوية:

- عليه من الكرتون تحوي ١٠ تحاميل من **غليسيرول ميديوتيك** أطفال ضمن شريطي بليستر بلاستيكي.

- عليه من الكرتون تحوي ١٠ تحاميل من **غليسيرول ميديوتيك** بالقىن ضمن شريطي بليستر بلاستيكي.

0781 Ed01 10/2017

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

- لا تؤخذ مساحق مطحونة مع محلول وتسليلاً خالداً لتجنب تسميمه.

- اتبع بدقة وسلامة المليبس وطريقة الاستعمال الموصوف عليه وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- لا تؤدب ملمسه على المريض بالدواء، ويندمجه به.

- لا تقطعه بذيله الحادة ذلك من لقاءه مقدس.

- لا تذكر سرطانه من قوى وسمة طيبة.

(مجلس وزراء الصحة العرب)



مختبرات ميديوتيك للصناعات الدوائية

ص.ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٢١٦٠