

فينوبارييتال ميديوتيك (مضغوطات)

(فينوبارييتال ١٥، ٣٠، ٦٠، ١٠٠ ملغ)



التركيب: تحوي المضغوطات على ١٥ أو ٣٠ أو ٦٠ أو ١٠٠ ملغ فينوبارييتال.

السواغ: مغنيزيوم سترات - إيريوزل - نشاء - ميكروكريستالين سيلولوز - لاكلوز - ملون زهر (٣٠ملغ) - ملون أخضر (٦٠ملغ) - ملون سماوي (١٠٠ملغ).

آلية التأثير والتأثيرات الدوائية: الفينوبارييتال مركب باريتوري طويل المفعول منبسط للجلعة العصبية المركزية بجرعات العادية، يعمل فينوبارييتال كمركن ومضاد للاختلاج، الحركة الدوائية: يبدأ عمل فينوبارييتال خلال ١٥ دقيقة، ويستمر لفترة تتراوح بين ٥ إلى ٦ ساعات، يتم إزالته إلى ٣٠ سميته في الكبد.

مميزات

الاستطيات: يستخدم فينوبارييتال ميديوتيك كمركن أو مضاد للاختلاج - مضادات الاستطيات: يجب عدم استخدام فينوبارييتال ميديوتيك في المرضى المعروفين بفرط الحساسية للباربيتورات. يحدث في هؤلاء المرضى أذية كبدية شديدة عند استخدام جرعات عالية، وتترافق عادة مع حدوث التهاب جلدي ومشاركة الأعضاء المتتية. بعد وجود سوابق حدوث فرط الحساسية الحاد، الأشخاص أو العائلية أحد مضادات الاستطيات المعلقة للغاية لاستخدام الباربيتورات. يجب عدم استخدام فينوبارييتال أيضا في المرضى الذين يعانون من تفاعل ملحوظ في وظيفة الكبد. أو أمراض الجهاز التنفسي حيث يكون حقيق التنفس أو الاندساد واضحا. ينبغي ألا يعطى المستحضر للأشخاص المبروفين بحالات إدمان سابقة على زمرة المركبات والمونومات، نظرا لأن الجرعات العادية قد تكون غير فعالة، وقد تسهم في زيادة حالات الإدمان.

التأثيرات الجانبية:

تنشيط الجهاز العصبي المركزي: تركيز ونعاس وخمول ودوار. كما قد تبرز بعض الاضطرابات المطفئة والرهاب، قد تزداد الباربيتورات، مثل الفينوبارييتال، في بعض الأشخاص إلى حدوث الآثار بدلا عن التنشيط بشكل متكرر. كغيرها من الأدوية المنومة غير المسكدة، قد تسبب الباربيتورات مثل الفينوبارييتال، عند وجود الألم، راحة وإثارة وحتى الهذيان. قد تستمر الآثار لأيام بعد إيقاف الدواء.

الحساسية (الدوران): الهبوط التنفسي، توقف التنفس، انهيار الدورة الدموية. فرط الحساسية المكتسبة تجاه الباربيتورات التي يكون أساسا في ردود الفعل التفسيرية التي تحدث خاصة في الأشخاص الذين يعانون من الربو والشرى والوذمة الوعائية وظروف مماثلة، تشمل تفاعلات فرط الحساسية في الجلد، تورم موضعي، أو سعال في الحنجرة أو القصبة، والتهاب الجلد الحاصل. قد يسبب الفينوبارييتال، بشكل نادر، التهاب الجلد التقرشي (مثل متلازمة ستيفنز - جونسون) والحالات الشديدة التقرشي (السمي) ويمكن أن تكون هذه التغيرات قاتلة. قد تترافق الانفعالات الجلدية بالحُمى والهذيان، والتغيرات التنفسية الملحوظة في الكبد وغيرها من الأجهزة المتتية، وفي بعض الحالات، ارتباطا بفرط ضغط الدم الضخم الأرومات مع الاستخدام المزمّن للفينوبارييتال.

تأثيرات جانبية أخرى: الغثيان والقيء والصداغ.

تحذيرات الاستعمال: قد تزيد الباربيتورات جرعات صغيرة، رد الفعل لمستحضرات المؤلمة، فتقليلها لوحدها، لا يمكن الاعتماد عليه لتخفيف الألم أو حتى لإحداث الترنين أو النوم بوجود الألم شديد.

تفجر الباربيتورات نشاط ميكروزمات الكبد الأروماتية. وهذا يؤدي إلى تسريع التحول الحيوي للأدوية المخدرة، وربما هو جزء من آلية التفاعل التي تعترض الباربيتورات، ولذلك، ينبغي استخدام الفينوبارييتال، مع توخي الحذر في المرضى الذين يعانون من انخفاض في وظيفة الكبد. كما ينبغي أن تستخدم هذه الأدوية بحذر للمرضى الذين لديهم تاريخ في التعاطي وإساءة استعمال الأدوية.

قد يقلل فينوبارييتال من قوة مضادات التشنج الكوإمائية، ولذلك، ينبغي أن يقوم المرضى الذين يتلقون هذه المشاركة بمراقبة البروتوكول بشكل أكثر توأرا. كما هو الحال مع غيره من المركبات والمونومات، قد يتفاعل المرضى المسنون أو الواهنون مع الباربيتورات بإثارة أو اكتئاب أو تراكب ملحوظين. قد تتصاعد التأثيرات الجهازية للهيدروكورتيزون الخارجوي والهيدروكورتيزون الداخلي (الكورتيزول) - تأثيرات الفينوبارييتال. ينبغي أن يستخدم هذا المستحضر بحذر في المرضى الذين لديهم انخفاض حاد في الوظيفة الكظرية، بعض النظر عما إذا كان هذا الانخفاض يعود إلى العدة التنشيمية أو العدة الكظرية الأولية. قد يعمل فينوبارييتال التخدير العميق و / أو المادية اللازمة لإدلاء المهام التي قد تكون خطيرة، مثل قيادة سيارة أو تشغيل الآلات، وينبغي تحذير المرضى تبعاً لذلك.

الحمل (فئة C): يستخدم فينوبارييتال أثناء الحمل فقط عند الاضطرار أو الواضح لاستخدامه.

الإمهاء المرضية: يجب توخي الحذر عند استخدام الفينوبارييتال لأمراة حاملة.

التداخلات الدوائية: يعطى الفينوبارييتال بمشاركة مع الكحول والمهدئات ومثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى. تأثيرات مقلبة مضادة، لهذا ينبغي أن يتم تنبيه المرضى لذلك، يجب تحذير المرضى الذين يتناولون هذا المستحضر. التقييد بالجرعة الموصوفة من قبل الطبيب وعدم تجاوزها. حدثت بعض التأثيرات السمية والوفيات عقب تناول فينوبارييتال لوحده أو بمشاركة مع مثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى. ينبغي توخي الحذر في وصف كميات كبيرة دون داع من الفينوبارييتال للمرضى الذين لديهم تاريخ اضطرابات عاطفية أو تفكير بالانتحار أو الذين قد يقومون بإساءة استخدام الكحول وأدوية الجهاز العصبي المركزي الأخرى.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

الجرعة الموصوفة عن طريق الفم:

البالغين - ٣٠ إلى ١٢٠ ملغ يوميا موزعة على جرعتين أو ثلاث جرعات.

الأطفال - ٦ ملغ / كغ من وزن الجسم موزعة على ثلاث جرعات.

الجرعة الموصوفة عن طريق الفم:

البالغين - ١٠٠ إلى ٣٢٠ ملغ

الجرعة الموصوفة للاختلاج عن طريق الفم:

البالغين - ٥٠ إلى ١٠٠ ملغ ٣-٢ مرات يوميا

الأطفال - ١٥ إلى ٥٠ ملغ، ٣-٢ مرات يوميا

حالات فرط الجرعة: تتجلى علامات وأعراض التسمم بالباربيتورات خاصة في الجملة العصبية المركزية وفي الجملة القلبية العصبية. تشبه حالة التسمم المتوسطة حالة السكر الكحولية. أما في حالات التسمم الشديد، فيفقد المريض الوعي، ويصبح مستوى النشاط الانعكاسي مطابق بصورة عامة بالشدّة لحالات التنشيط المركزي. قد تستمر ردود الفعل المقلبة لبعض الوقت على الرغم من وجود القيوية. يمكن أن تتفحص الحكة وتنشيط للصرع، ولكن بعد مرور فترة من الوقت على التسمم بالباربيتورات قد تظهر تنوع خللي بسبب نقص التنكس، يتأثر التنفس مبكرا، قد يكون التنفس إما بطيئا أو سريع وسطحي. كما ينخفض ضغط الدم، وهكذا يحدث للمريض عرض صدمة نموذجية، مع نبض ضعيف وسريع، وجلد بارد ورائد، وارتفاع وانخفاض في الهيماتوكريت. تحذر مضاعفات الجهاز التنفسي والفشل الكلوي أكثر سوءا وهي تحدث بشكل متكرر في حالات التسمم الشديد بالباربيتورات. عادة ما يكون هناك انخفاض في درجة حرارة الجسم، مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى ٣٢ درجة مئوية.

العلاج: يجب أن يتضمن التدبير العام المصاحب عرضية تداعسية، بما في ذلك غسل المعدة، استخدم السوائل الوريدية، والحفاظ على ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والتدخل تنفسي كاف. سيؤدي التثاق الكلوي من معدل إزالة الباربيتورات وسوائل الجسم. كما قد يلزم استخدام المضادات الدوائية لضبط المضاعفات الوردية.

التعليمات: مضغوطات فينوبارييتال ميديوتيك - ١٥ ملغ: عالية تحوي ٣٠ مضغوطات بلون أبيض ضمن ٣ شريطة بليستر.

مضغوطات فينوبارييتال ميديوتيك - ٣٠ ملغ: عالية تحوي ٣٠ مضغوطات بلون زهر ضمن ٣ شريطة بليستر.

مضغوطات فينوبارييتال ميديوتيك - ٦٠ ملغ: عالية تحوي ٣٠ مضغوطات بلون أخضر ضمن ٣ شريطة بليستر.

مضغوطات فينوبارييتال ميديوتيك - ١٠٠ ملغ: عالية تحوي ٣٠ مضغوطات بلون سماوي ضمن ٣ شريطة بليستر.

شروط الحفظ: "يحفظ في درجة حرارة تحت ٣٠م°
"يحفظ بعيدا عن الرطوبة والضوء"

0783 Ed01 07/2017

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
- الدواء مستحضر بوتر على صحت واستهلاكه خلافا لتعليمات بعرضه لخطر.
- اتبع بدقة تعليمات الطبيب وطريقة الاستعمال المضمنة فيها وتعليمات المبدئي الذي سرها لك.
- الطبيب المعالج هو المسؤول عن تحديد الجرعة، وتبني وصفه.
- لا تتقدم بمدة العلاج حدها كما في تلك.
- لا تكرر جرعة الدواء أو دون وصفة طبية.

(اتحاد الصيدالوج العرب)

مففاترات ميديوتيك للاستخدامات الجهازية

ص.ب ٤١١ - حفص - سوريا - هاتف ٢٠٠٠ - فاكس ٢٣٣٣٦١