



## ميديوبروفين مضغوطات ملمسة - شراب معلق

مضاد التهاب غير ستيرويد

**التركيب:** كل مضغوط ملمسة ميديوبروفين تحوي على ٤٠٠ ملغم بيوبروفين . شراب معلق: كل مل من ميديوبروفين شراب معلق تحوي على ١٠٠ ملغم بيوبروفين .

- الغوص:**
- بيوبروفين أحد مشتقات حمض البروبionic التي تقطع عملية اصطناع البروستاغلاندينات .
  - يملك ميديوبروفين خواص مضادة لالتهاب و مضادة لآلام و خاصة الحرارة .
  - سريع الامتصاص عندما يؤخذ عن طريق الفم حيث يصل إلى نزوة متواه في المصل بعد ١ - ٢ ساعة من اعطائه .

- الاستطبابات :**
- التهاب المucus الرئوي (رمائين المفاسد) . - التهاب القفار القصلي .
  - التهاب المفاسد و التهاب المفاصد . - التهاب المفاصد غير الرئوي .
  - الاصطربات حول المفاسد و تشمل :
    - التهاب القشة الراتبلي
    - الاصربات الرضبة و الولبي
    - الام ما بعد العمليات الجراحية
  - التهاب المخاطة الكتف
  - التهاب المخاطة الظهر
  - التهاب الورك
  - التهاب المفاصد
  - التهاب المفاصد الضام و الاصطربات العضلية الهيكالية

**التأثيرات الجانبية:** ازراج ظهي ، قيء ، سعال ، ملمس ، تحرير الجهاز الهضمي .

- مضادات الاصطربات :**
- التحسس الشديد للعلفية بيوبروفين .
  - التحسس للأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى .
  - وجود قصبة فرجية هضمية عاملة .
  - وجود تشنج ضئلي و ربو ( و هو نسيبي حيث يمكن اعطاء ميديوبروفين مع المراقبة ) .

- التحذيرات :**
- يعطي بحد المرض الذين يعانون من فصوص كدي او كلري شديد .
  - يدخل ميديوبروفين - كردة ما - في الوظيفة الصوحية ، لذلك يجب عدم اعطاء الدواء مع الأدوية المضادة للتختثر الفموية مثل الكورمان .
  - يجب مراعاة المرضين الذين يحملون قصة امراض في سجلهم الضمسي خالية حيث تزداد تفاصيل ضمسي .
  - على كل الارواح **نحو** عدم اعطاء الدوام الا بشراب الطيب و خاصة في الاشهر الثلاثة الاولى ، ينطرج كمية قليلة مع خلاص الام لذا يفضل عدم تناوله من قبل الاميات المرضعات .

- ال الحالات الطارئة :**
- الابويروفين يزيد من الترتكز العضلية لكل من الديوكسين و الليتوم .
  - قد يزيد من سمية الميتوبرافات المخدودة المميتة ايجابا .
  - في حالات ناررة يزيد سمية الفنتون .
  - قد يقص من قلادة بعض اضافات الصنف المزدوج .
  - يزيد من التأثير الجانبي المركزي للمضادات الجوية فئة الكينولون مثل السيفروفلوكاسين ( التأثير على الجهاز العصبي المركزي CNS قد يؤدي إلى تشنجات ) .

- الجرعة و طريقة الاستعمال :**
- يجب أن يؤخذ ميديوبروفين خلال أو بعد الطعام مباشرة .
  - الكبسولة: ١٢٠٠ ملغم يوميا (٣ مضغوطات ملمسة يوميا ) ثم ينخفض المقدار **نحو** ٦٠٠ - ٨٠٠ ملغم يوميا

- الافلاع:**
- لتخفيف الحرارة و لتخفيف الالم البسيط و المعتدل فإن الجرعة اليومية هي ٤٠ ملغم / كع ( و بجرعات مجزأة .
  - لا ينصح باعطاء ميديوبروفين للأطفال الذين يتقدرون بهم عن ٧ فيع .

- الفعالية:**
- نصف ملعقة صغيرة (٢ مل - ٥ مل - ٤ مل ) - ٣ مل **نحو** ٥٠٠ ملغم .
  - ملعقة واحدة صغيرة (٥ مل - ١٠٠ مل - ٣ مل ) **نحو** ٦٠٠ ملغم .
  - ملعقة صغيرة (٠ مل - ٢٠٠ مل - ٣ مل ) **نحو** ٨٠٠ ملغم .

**المضغوطات ملمسة:** كل علبة تحوي ٢٠٠ مضغوطات ملمسة .

**شراب معلق:** كل علبة تحوي ١٠٠ مل شراب معلق .

0728 Ed 02 11/2007

### \* هذا دواء \*

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .
- ادواء مستحضر يوفر من محتواه واستهلاكه خالد للتعليمات بوعوده للخطر .
- ااتج بذقة وصفة الطيب و طريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطيب ، والصيدلي **نحو** المخبرين بالاسرار ، ويفهمه وضرره .
- لا تفتعل مدة الدارج المحددة لك من الماء ، فهذا خطأ .
- لا تكرر مصرف الدوا ، من دون وصفة طيبة .

( مجلس وزراء الصحة العرب )

## مختبرات ميديه تيك للصناعات الدوائية

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٢١٦٠

# MEDIOPROFEN

Coated Tablets - Oral Suspension

Non-Steroidal Anti-Inflammatory drug



## Composition:

Coated Tablets: Each coated tablet contains 400 mg Ibuprofen.

Oral Suspension: Each 5ml of oral suspension contains 100 mg Ibuprofen.

## Properties:

- Ibuprofen is a propionic derivative that inhibits prostaglandin synthesis.
- **Medioprofen** is a non-steroidal anti-inflammatory drug NSAIDS, analgesic and antipyretic.
- When taken orally, peak serum level of ibuprofen occurs 1-2 hours after ingestion.

## Indications:

- Rheumatoid arthritis.
- Ankylosing Spondylitis.
- Osteoarthritis.
- Non-rheumatoid Arthropathies.

Periarticular conditions such as

- |                  |                              |  |
|------------------|------------------------------|--|
| - Bursitis.      | - Musculoskeletal disorders. | - Traumatic cases, sprains.            |
| - Low back pain. | - Postoperative pain.        | - Frozen shoulder (capsulitis).        |
| - Dental pain.   | - Tendinitis and Synovitis.  | - Soft tissue inflammatory conditions. |

## Side Effects:

- Abdominal discomfort, anorexia, diarrhea, tinnitus and gastrointestinal irritation.

## Contraindications:

- Hypersensitivity to Ibuprofen.
- Hypersensitivity to Aspirin or other Non-Steroidal Anti-Inflammatory (NSAI) drugs.
- History of Active peptic ulceration.
- Bronchospasm or asthma (relative contra-indication, as this medication may be administrated with observation).

## Precautions:

- It should be given with care to patients with liver or renal failure.
- Avoid concomitant use with oral anticoagulants drugs (such as coumarin), as interactions have been reported in some patients.
- Caution is required in patients with a history of gastrointestinal disease (high risk of peptic ulceration).
- Like all drugs, **Medioprofen** must not be used during the first 3 months of pregnancy, and it's not recommended during lactation.

## Drug interactions:

- Ibuprofen increases the serum concentrations of both Digoxin and lithium.
- Severe and in some cases fatal aggravation of Methotrexate toxicity has been reported.
- In rare cases, Ibuprofen may increase the phenytoin toxicity.
- It may attenuate the hypotensive effect of some Antihypertensive drugs.
- It may increase the central adverse effects of quinolone antibiotics such as ciprofloxacin (this effect on CNS may lead to convulsions).

## Dosage & Administration:

- **Medioprofen** should be taken during or after meals.

Adults: First dose: 1200 mg daily, (400 mg 3 times daily).

Then the dose is decreased to the maintenance dose (600 – 800) mg daily.

Children: The daily dosage of **Medioprofen** is 20 mg / kg of body weight in divided doses.

For children weighing less than 30 kg, the total doses during 24 hours period should not exceed 500mg.

Not recommended for children weighing less than 7 kg.

1-2 years: One-half tea spoonful (2.5 ml = 50 mg) (3 - 4) times daily.

3-7 years: One tea spoonful (5 ml = 100 mg) (3 - 4) times daily.

8-12 years: Two tea spoonful (10 ml = 200 mg) (3 - 4) times daily.

## Presentation:

Coated Tablets: Each box of contains 20 coated tablets.

## \* THIS IS A MEDICAMENT \*

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

( Council of Arab Ministers ) ( Union of Arab Pharmacists )

**Mediopic Labs Pharmaceutical Industries**

www.mediopic.com - Homs - SYRIA - Tel: 2222160