

ميديوفوريل

(كبسول، معلق فموي)



التوصيات:

كل كبسولة ميديوفوريل تحتوي: ٢٠٠ ملغم نيفروكسازيد.

كل ٥ مل ميديوفوريل معلق فموي يحتوي: ٢٢٠ ملغم نيفروكسازيد.

السواحل: شمامات المغنيزيوم، بوفون، ماء منزوع الشوارد.

المكبسول: شمامات المغنيزيوم، كاربوكسيك مينيل سيلولوز، ميكروكريستالين سيلولوز، حمض الليمون، كحول، مادة مضادة للرغوة، عطر الموز، سكروز، مينتيل باربين.

الصوديوم، بربوتيل باربين الصوديوم، ماء منزوع الشوارد.

الخصائص:

نيفروكسازيد، هو أحد مشتقات نيتروفوران، وهو مضاد واسع الطيف للإنتانات المعموية. أظهر نيفروكسازيد فعاليته ضد العوامل الممرضة التالية المسيبة للإسهال الانتاني:

الإشريريكية البكتيرية، المكورات العنقودية الرمية، المكورات العقدي، المكورات العصوية، العصوية، الكليسيلا، الأمعائية، السيراتيه.

الحركة الدואية:

إن امتصاص نيفروكسازيد ضئيل جداً عندما لا يكون هناك اعطال في مخاطية الأمعاء.

الاستطبابات:

يتنبّط ميديوفوريل في الحالات التالية:

- علاج الإسهال الحاد غير الجامح الذي يفترض أن يكون جرثومي المنشأ.

- العلاج والوقاية من اسباب الفسفر.

- علاج مساعد لالتهاب الكولون الحاد.

تقدير أهمية إعادة الإماهة فموياً أو وريدياً حسب شدة الإسهال، العمر وحالة المريض (الأرضان المرافق،...).

مضادات الاستطبابات:

إن استعمال ميديوفوريل مضاد استطباب في حال:

فرط الصاصية لأي من المكونات في المستحضر، أو لأي من مشتقات النيتروفوران.

المكبسول: الأطفال تحت عمر ١٥ سنة.

ال禁忌 التقني:

هذا الدواء عنانة جيد التحمل ولكن هناك احتمال حدوث تفاعلات حساسية من نعيم النفع، الشري، الوذمة الوعائية أو التاق.

التحذيرات والاحتياطات:

- إلغى الطبيب في حال استمرار الإسهال لأكثر من يومين أو في حال تفاقمه، وفي حال وجود حمى و/أو دم في البراز.

- عادةً ما يحدث تضليل في السوائل والشوارد عند المرضى الذين يعانون من إسهال شديد، في حالات كهذه بعد إعطاء السوائل والشوارد المناسبة أمراً مهمًا جداً، استخدام هذا الدواء لا ينفي الحاجة إلى معالجة المناسبة بالسوائل والشوارد.

- إن إعادة الإماهة هي الملاج الأأسلي للإسهال الحاد عند الأطفال يعمّر أقل من سنين. بعد هذا العمر ينبغي تقدير الحاجة للإمامه بشكل منهجي.

- في حال استمرار الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام، ينبغي مراعاة ما يعقب قطعه، ويجب اتخاذ إجراءات الإمامه فموياً أو وريدياً.

- بسبب وجود السكروز، ينبغي على المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة من عدم تحمل الفركوز، سوء امتصاص الغلوكوز-الغالاكتوز أو قصور اندماج سكراز-إيزوز-الناتاز، حتم تناول هذا الدواء.

- في حال تناول البراز السائل أكثر من ٦ مرات في اليوم أو استمرار الإسهال أكثر من ٤٤ ساعة أو ترافق مع خسارة في الوزن، أو في حال وجود دم أو مخاط

في البراز، يجب على المريض استشارة الطبيب.

- يجب إلغاء الدواء مع بعض الأغذية خاصة الخضار النباتية، الفواكه، الخضار الورقية، الأطباق المبهرا، بالإضافة إلى الطعام أو المشروبات المجمدة، والتركيز على تناول اللحوم السوية والأرز.

التدافعات الوراثية:

لا يجب إعطاء هذا الدواء مع الأدوية التي تغزّل تفاعل (Antabuse) (ومع مثبطات الجملة العصبية المركزية).

الحمل والإرضاع:

من الأفضل عدم تناول نيفروكسازيد خلال الحمل كإجراء احتياطي.

يُنصح الإرضاع ممكناً في حال كانت المعالجة قصيرة بهذا الدواء.

فرط البردعة:

في حال فرط البردعة بالنيتروفوكسازيد يجب مرافقه المريض وتطبيق المعالجة العرضية.

الجرعة وطريقة الاستخدام:

- ميديوفوريل يؤخذ فموياً، تبلغ الكبسولة مع كأس من الماء.

- تناول ميديوفوريل كما وجده الطبيب.

- مدة العلاج محددة بثلاثة أيام.

- في حال تسبّب الجرعة في تذكرة مبكرة، إلا إذا كان موعد الجرعة التالية قريباً. لا تؤخذ جرعة مضاعفة على دفع واحدة.

- لا يعطي دون ١٨ سنة.

المكبسول:

- الجرعة المعتادة الموصى بها للبالغين هي كبسولة واحدة عيار ٢٠٠ ملغم تؤخذ ٤ مرات يومياً أو كبسولة واحدة عيار ٤٠٠ ملغم مرتين يومياً.

شروط الحفظ:

- يحفظ بعيداً عن الضوء والرطوبة.

- يحفظ في درجة حرارة الغرفة، بين (١٥ - ٣٠) °م.

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

- التعينة:

عليه من الكرتون خاري ٣ شريط بليستر، وكل شريط يحوي ١٠ كبسولات.

عليه من الكرتون تحتوي عبوة زجاجية سعة ٩٠ مل من المعلق الفموي، مجهزة بقطاء معندي.

0725 Ed03 01/2021

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيادي الذي صرفها لك.

- الطبيب والصيادي هما الخبراء بالدواء، وبنفعه وضرره.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاً نفسك.

- لا تكرر مسرف الدواء، من دون وصفة طبية.

(مجلس وزراء الصحة العرب)



مختبرات ميديوفوريل للصناعات الدوائية

ص.ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٢١٦٠

