



ميكونزالين بلس (تحميل مهبلية)

التركيب الكيميائي:

تحتوي كل تحميلية من ميكونزالين بلس على ميترونيدازول ٥٠٠ ملغ، ميكونزاول نترات ١٠٠ ملغ.

السواغات: زيت نباتي مهدرج، إيثوزيل.

البئة والتأثيرات والتأثيرات الدوائية:

يحتوي المستحضر على ميكونزاول كمضاد فطور . ميترونيدازول للتأثيرات المضادة للجراثيم والمضادة لداء المشعرات المهبلية نترات الميكونزاول هو مضاد فطري واسع الطيف وفعال بشكل خاص ضد الفطريات المرضية بما فيها المبيضات البيض. بالإضافة إلى ذلك، فإن نترات الميكونزاول فعّال ضد الجراثيم إيجابية غرام. ميترونيدازول هو مضاد للجراثيم ومضاد لوحيديات الخلية، على سبيل المثال، الغاردنرية المهبلية والجراثيم اللاهوائية بما في ذلك العدّيات اللاهوائية والمشعرة المهبلية.

الحركية الدوائية:

امتصاص نترات الميكونزاول عبر الطريق المهبلية منخفض جداً (حوالي ١,٤% من الجرعة). يبلغ التوافر الحيوي للميترونيدازول عن طريق المهبل ٢٠% بالمقارنة مع الاستخدام عن طريق الفم، لا يمكن الكشف عن نترات الميكونزاول في البلازما بعد التطبيق المهبلية للتحميل. مستوى الحالة الثابتة من ميترونيدازول في البلازما تصل إلى ١,٦ - ٢,٢ ميكروغرام/مل. يستقلب ميترونيدازول في الكبد المستقلبات الهيدروكسيلية فعالة. يبلغ عمر النصف لميترونيدازول ١١-١٢ ساعة. يطرح حوالي ٢٠% من الجرعة دون تغيير في البول.

الاستقطابيات:

يستخدم (ميترونيدازول + نترات الميكونزاول) للتحميل المهبلية للعلاج الموضعي للخمج المهبلية بوجود بعض الفطريات (على سبيل المثال المبيضات البيض)، وبعض أنواع الجراثيم وغيرها من الكائنات المسببة للأمراض (المشعرة المهبلية).

مضادات استقطاب:

يجب عدم استخدام ميترونيدازول + ميكونزاول نترات في الحالات التالية:

- فرط الحساسية لأي من مكونات التحميلية.
- الحمل (لأسما في الأشهر الثلاثة الأولى).
- مشاكل شديدة مع الكبد (اضطرابات وظيفة الكبد بما في ذلك الأمراض الاستقلابية التي تسمى "البيروفيرا").
- أمراض الجهاز العصبي.
- اضطرابات في إنتاج الدم.

التحذيرات والاحتياطات:

ينبغي عدم تناول الكحول أثناء العلاج ولمدة ٢٤-٤٨ ساعة على الأقل بعد انتهاء العلاج بالطبيع بسبب احتمال حدوث اختلاطات وزيادة الكحول. ينبغي عدم استخدام التحميلية بالمشاركة مع الوبائيات الميكانيكية المانعة للحمل، وذلك بسبب تداخل السواغات الموجود في التحميلية المهبلية مع المطاط، مؤدياً إلى الكسر.

الحمل والإرضاع:

بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يمكن استخدام (ميترونيدازول + ميكونزاول نترات) التحميلية المهبلية عندما يراها الطبيب ضرورية، ولكن يجب أن تستخدم تحت المراقبة.

غير مسموح بالرضاعة الطبيعية أثناء استخدام (ميترونيدازول + ميكونزاول نترات) نظراً لمرور المكونات الفعالة إلى الحليب. يمكن البدء بالرضاعة الطبيعية مرة أخرى بعد ٢٤-٤٨ ساعة بعد الانتهاء من العلاج.

التأثيرات الجانبية:

اضطرابات مهبلية: تحريش المهبل (حرق وحكة). بسبب التهاب الغشاء المخاطي المهبلية في المهبل، يمكن حدوث تحريش المهبل بعد استخدام التحميلية للمرة الأولى أو حتى اليوم الثالث من العلاج. هذه الشكاوى تختفي بسرعة عند استمرار العلاج. إذا كان هناك تهيج شديد، ينبغي إبلاغ الطبيب لأنه قد يكون من الضروري وقف العلاج.

اضطرابات الجهاز الهضمي: ألم في البطن أو تشنجات، طمع معدي، إمساك، جفاف الفم، نادرًا ما يحدث إسهال، نقص الشهية، القيء، الغثيان.

اضطرابات الجهاز العصبي: صداع، ترونج، دوخة، تغيرات عقلية، اعتلال عصبي محيطي بعد جرعة زائدة أو فترة طويلة من الاستخدام، تشنجات.

اضطرابات الجلد: طفح جلدي.

اضطرابات الدم: انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء.

التداخلات الدوائية:

نظراً لامتصاص المكونات الفعالة من (ميترونيدازول + ميكونزاول نترات)، قد تحدث تداخلات، إذا تم استخدام المستحضر بشكل متزامن مع الكحول (قد يزيد (ميترونيدازول + ميكونزاول نترات) من التناثر مع الكحول) أو أي من الأدوية التالية:

- الأدوية الممعية للدم (مضادات التخثر الفموية).
- مضادات الصرع (الفينيتوين، الفينوباريتال).
- الأدوية التي تخفف حموضة المعدة (سيميتيد).
- الدواء الذي يستخدم لمعالجة التسهم بالكحول (الديسولفيرام).
- الأدوية المضادة للذهان والاكئاب (الليثيوم).
- الأدوية المضادة للتشنج (ستيميزول وتيرفينادين).

يمكن أن تتغير القصور المخبرية أثناء استخدام (ميترونيدازول + ميكونزاول نترات):

لنلاحظ تداخل مع مستويات الدم من إنزيمات الكبد والسكر (طريقة هيكسوكيناز)، الثيوفيلين والبروكاين أميد

الجرعة وطريقة الاستعمال:

يجب عدم استخدام الدواء دون استشارة طبيب. ما لم ينصح الطبيب خلاف ذلك، قم بإدراج تحميلية مهبلية واحدة ليلاً وتحميلية مهبلية واحدة في الصباح لمدة ٧ أيام.

في الحالات النادرة، أو عندما يقاوم التهاب المهبل العلاجات الأخرى ينبغي إدراج تحميلية مهبلية بمكان عال في المهبل في الليل وفي الصباح لمدة ١٤ يوماً. ينبغي إدراج التحميلية بمكان عال في المهبل.

كبار السن بعمر ٦٥ سنة وأكبر: نفس جرعة البالغين الشباب.

الأطفال: لا يوصى به للأطفال.

حالات فرط الجرعة:

لا يوجد أي خبرة لحالات فرط جرعة تحميل (ميترونيدازول + ميكونزاول نترات) في الإنسان. يمكن امتصاص الميترونيدازول بكميات تكفي لإنتاج تأثيرات في الجسم إذا أخذت بطريق الخطأ كميات كبيرة من المنتج، فإن إفراغ المعدة قد يعتبر ضرورياً. أعراض فرط الجرعة من ميترونيدازول هي الغثيان والقيء، ألم في البطن، إسهال، حكة، طمع معدي، اضطرابات الحركة (ترونج)، دوام، أحاسيس غير عادية على الجلد (تتميل)، مغصبات، وانخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، اعماق البول، أما أعراض فرط الجرعة من ميكونزاول نترات فهي غثيان آباء، تفرح في الحلق والقيء، قلة الشهية، صداع وإسهال.

شروط الحفظ: يحفظ في درجة حرارة الغرفة، أقل من ٢٥ °م

التعبئة: علبة من الكرتون تحوي شرطي بلسنر وكل شرطي بحوي ٧ تحميل.

0781 E001 04/2018

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
- المواد مستحضر بولتر عى حثاكن واستهلاكه خلافا لتعليمات بعرفهاك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال، تنموس عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرف لكها،
- الطبيب والصيدلي هما الاختيار بادءاوم وتعتقه وضروه .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من ذلك، ففصا .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .
- (مجلس وزراء الصحة العربي)

(الاتحاد الصيدلانية العرب)

مفحاتاريد ديوتيك للصناعات الدوائية

ص، ب ٤١٥ - حمص، سوريا - هاتف ٢٢٢٢١٦٠٠

