

ميكرولين (كريم جلدي)

ميكونازول تترات



التركيب الكيميائي والسواغات: كل ١ غ ميكروز الين كريم يحتوي : ٢٠ مل من ميكونازول تترات.

السواغات: كوتينا GMS، ستيوسينيل الكحول،إيمولجين B2، فازلين، زيت البارافين، غليسرين، ميتييل بارابين الصودي، بروبيل بارابين الصودي، ماء متزوج الشوارد.

الزمرة المولوية مضاد فطوري.

آلية التأثير:

يقتل الميكروبات الفطوري والخمائر من خلال التدخل على مستوى غشاء الخلية. يعمل من خلال إيقاف الفطر عن إنتاج مادة تدعى الارغوسينون، التي هو عبارة عن مادة أساسية في تركيب الغشاء الخلوي للنفط. هذا التناقض في إنتاج الارغوسينون سبب تناقض في تركيب الغشاء مما يجعل ذلك تقويب ضمن الغشاء وغشاء الخلية الفطرية أساسى في بقائها على قيد الحياة.

الاستطبابات:

معالجة معمدة حالات القدم الرياضية، الحكة الناتجة عن سعة الأرفاع والقوباء الحلقية.
يخفف من الحكة، الحرقة، التقشير والشعور بعدم الراحة المترافق مع هذه الحالات.

مضادات الاستطبابات:

عند المرضى الذين لديهم فرط حساسية تجاه المادة الفعالة أو أحد السواغات.
عند المرضى الذين لم يتم تشخيص انتان خميرة مهبلية سابق لديهم من قبل الطبيب.

أثر جانبى:

غير شائعة: تبييع الجلد (الإحساس بالحرق، احمرار، دفء، حكة) في مكان التطبيق.

الحمل والإرضاع:

• يجب أن يستخدم ميكروز الين بحذر خلال الحمل، وقطف عندما تكون الفائدة المرجوة منه للأم تفوق أي خطر محتمل على نتطور الجنين. يجب طلب المساعدة الطبية من الطبيب قبل استخدام الدواء في حال الحمل.

• يجب استخدام ميكروز الين بحذر من قبل الأمهات المرضعات وقطف إذا كانت الفائدة المرجوة منه للأم أكبر من الخطر المحتمل على الرضيع. كما يجب طلب المساعدة الطبية من الطبيب قبل استخدام الدواء في حالة الإرضاع. وفي حال تم استخدام الكريم خلال الإرضاع يجب الأ يطيل على جلد الثديين بقيرة قصيرة قبل الإرضاع لتجنب ابتلاعه من قبل الرضيع.

تحذيرات:

١. يجب استعمال ميكروز الين عند الأطفال تحت عمر السنين إلا بنصيحة وإشراف الطبيب.
٢. لااستعمال الخارجي فقط.

٣. يجب تامن ميكروز الين مع العينين.

٤. يجب إيقاف استعمال ميكروز الين واستشارة الطبيب في حال:

• حدوث تخرش.

• لم يحدث تحسن خلال ٤ أسابيع (أجل القدم الرياضية والقوباء الحلقية) أو أسبوعين (أجل الحكة الناتجة عن سعة الأرفاع).

• تجنب استعمال ميكروز الين لطفح الحفاض.

٥. يجب طلب المساعدة الطبية في حال تم ابتلاع ميكروز الين.

الاتصالات المولوية:

• من غير المحتمل أن يمتص الميكونازول عبر الجلد بكميات تكفي لتؤثر بشكل كبير مع الأدوية الأخرى التي تؤخذ عن طريق الفم.
• في حال تناوله مع الوارفارين فهناك احتمال قليل جداً أن يعزز الميكونازول الممتص من الكريم تأثير الوارفارين.
• ينصح في حال استخدامه مع أدوية موضعية أخرى أو مع مربطات تطبيق على مساحة الجلد ذاتها بالمباعدة ٣٠ دقيقة بين تطبيق كل من المستحضرات.

الجرعة وطريقة الاعطاء:

• تغسل المنطقة المصابة وتجف جيداً.

• تطبيق طبقة رقيقة على المنطقة المصابة مرتين بالليوم (صباحاً ومساءً) أو حسب إرشادات الطبيب.
• يجب الإشراف على الأطفال خلال استعمال هذا الدواء.

• من أجل القدم الرياضية: يجب العناية بشكل خاص بالأماكن بين الأصابع وارتداء حذاء ملائم، وأن تتم تهوية الأحذية وتغيير الحذاء والجوارب مرة باليوم على الأقل. يستعمل يومياً لمدة ٤ أسابيع من أجل القدم الرياضية والقوباء الحلقية، كما يستعمل يومياً لمدة أسبوعين من أجل الحكة الناتجة عن سعة الأرفاع.

• يجب استشارة الطبيب إذا استمرت الحالة لمدة أطول.

• هذا المستحضر غير فعال على فروة الرأس أو الأظافر.

الاحتياط:

- يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥° م.

- بعيداً عن متناول الأطفال.

التعينة:

- عليه كرتون تحوي تبوب المنيوم يحتوي ١٥ غ ميكروز الين كريم.

- عليه كرتون تحوي تبوب المنيوم يحتوي ٣٠ غ ميكروز الين كريم.

0732 Ed04 02/2021

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

- الدواء مستحضر يوضع على مسحة واسعةهذا خلافاً لتعليمات عرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب والصيدلي هما المخربان بالدواء، ويشمله وضرة.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقائ، نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء، من دون وصفة طبية.

(مجلس وزراء الصحة العرب)

(اتحاد الصيادلة العرب)

مختبرات ميديوتيل للصناعات الدوائية

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٢١٦٠



MECOZALEN (Dermal cream)

MICONAZOLE NITRATE



CHEMICAL COMPOSITION: Each 1 gr. contains: 20 mg MICONAZOLE NITRATE.

Excipients: Glyceryl Monostearate, Cetostearyl Alcohol, Eumulgin B₂, Vaseline, Liquid Paraffin, Glycerin, Methyl Paraben Sodium, Propyl Paraben Sodium, Deionized Water.

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION: Antifungal

MECHANISM OF ACTION:

Miconazole kills fungi and yeasts by interfering with their cell membranes. It works by stopping the fungi from producing a substance called ergosterol, which is an essential component of fungal cell membranes. The disruption in production of ergosterol disrupts the fungal cell membrane, causing holes to appear in it. The cell membranes of fungi are vital for their survival.

INDICATIONS:

Treatment of most athlete's foot, jock itch, and ringworm.

Relieves itching, burning, cracking, scaling and discomfort which accompany these conditions.

CONTRAINDICATIONS:

In patient has hypersensitivity to the active ingredient or to the excipients.

In patients who never had a vaginal yeast infection diagnosed by a doctor.

SIDE EFFECTS:

Uncommon:

Skin irritation (e.g. burning sensation, redness, warmth, itching) at the application site.

Pregnancy and breastfeeding:

- MECOZALEN should be used with caution during pregnancy, and only if the expected benefit to the mother is greater than any possible risk to the developing baby. you should seek medical advice from your doctor before using this medicine if you are pregnant.

- MECOZALEN should be used with caution by breastfeeding mothers, and only if the expected benefit to the mother is greater than any possible risk to the baby. you should seek medical advice from your doctor before using this medicine if you are breastfeeding. If you do use the cream while breastfeeding, you should not apply it to the skin of the breasts shortly before giving a feed, to avoid it being ingested by the nursing infant

WARNINGS:

1. Do not use MECOZALEN on children under 2 years of age except under the advice and supervision of a doctor.

2. For external use only.

3. When using MECOZALEN avoid contact with eyes.

4. Stop using MECOZALEN and ask a doctor

- irritation occurs
- there is no improvement within 4 weeks (for athlete's foot and ringworm) or 2 weeks (for jock itch).
- do not use for diaper rash

5. If swallowed, get medical help

DRUG INTERACTIONS:

• Miconazole is unlikely to be absorbed through the skin in sufficient amounts to significantly affect other medicines that you are taking by mouth.

• if you are taking warfarin, there is a very small chance that miconazole absorbed from this cream may enhance the effect of the warfarin.

• If you are using other topical medicines or moisturizers on the same area of skin it is recommended that you leave about 30 minutes between applying each product.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

• wash affected area and dry thoroughly

• Apply a thin layer over affected area twice daily (morning and night) or as directed by a doctor

• supervise children in the use of this product

• for athlete's foot, pay special attention to spaces between the toes, wear well-fitting, ventilated shoes and change shoes and socks at least once a day, for athlete's foot and ringworm use daily for 4 weeks, for jock itch use daily for 2 weeks

• if conditions persist longer, ask a doctor

• This product is not effective on the scalp or nails.

STORAGE:

- Store at temperature below 25 °C.

- Keep out of reach of children.

PACKAGE:

Aluminum tube contains 15 gr. MECOZALEN cream / carton box.

Aluminum tube contains 30 gr. MECOZALEN cream / carton box.

* THIS IS A MEDICAMENT *

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

(Council of Arab Ministers)

(Union of Arab Pharmacists)



Mediolic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediolic.com - Homs - SYRIA - Tel:2222160