

التركيب والسواغات:

كل ١ ميكوزالين كريم مهبلية يحتوي: ٢٠ ملغ من ميكونازول تترات.
كل تحميلية مهبلية من ميكونازول تحتوي: ٤٠٠ ملغ من ميكونازول تترات.

السواغات:

كريم مهبلية: ميثوسيتيريل الكحول، إيسولجين B2، فازلين، زيت البارافين، غليسرين، نياجين الصوديوم، نيازول الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم، غليسرين مونوسيترات، ماء مزروع الشوارد.

تحميل مهبلية: زيت نباتي مهدرج، إيريول.

آلية التثبي:

ميكونازول يجمع بين فعالية مضادة للفطريات تجاه الفطريات الجلدية والخمائر الشائعة مع فعالية مضادة للبكتيريا تجاه بعض العصيات إيجابية الغرام والمكورات. بشكل عام، ميكونازول يمارس تأثير سريع جداً على الحكة وهو عرضٌ كثيراً ما يصاحب الفطريات الجلدية وداء المبيضات.

الحركية الدوائية:

الإمتصاص: ميكونازول يبقى في المهبل لمدة تصل إلى ٧٢ ساعة بعد جرعة واحدة. الإمتصاص الجهازى للميكونازول بعد إعطاء عن طريق المهبل محدود والوافر الحيوى ١-٢٠% بعد التطبيق المهبلي وذلك لجرعة ١٠٠٠ ملغ للترشح. يرتبط الميكونازول المتمص ببروتينات البلازما بنسبة (٨٨.٢ ٪)، وخالها الدم الحمراء (١٠.٦ ٪).
الامتصاص والإخراج: الكمية الصغيرة من الميكونازول التي يتم إمتصاصها يتم إخراجها بشكل رئيسي في البراز بشكل نواتج غير متغير ومستقلبات خلال فترة ٤ أيام بعد الإعطاء.

الاحتياطات:

- لعلاج التهاب الفرج والمهبل الفطاري والعدوى الإضافية بسبب البكتيريا إيجابية الغرام.
- معالجة داء المبيضات المهبلية.
- لتفريق الحكة الخارجية والتهيج بسبب داء المبيضات المهبلية.

الجرعة وطريقة الإستعمال:

الكريم المهبلية:
البالغين (١٨ سنة فأكثر): يطبق محتويات حقن واحد (تقريباً كمية ٥ غ من الكريم) مرة واحدة يومياً بعمق داخل المهبل لمدة ١٠-١٤ يوم أو مرتين يومياً لمدة ١٤ أيام.
التهاب الفرج ينبغي تطبيق الكريم بشكل موضعي مرتين يومياً. يجب الاستمرار بالمعالجة حتى بعد زوال الحكة أو التثر الأبيض أو بعد بدء الحيض.
الأطفال (عمر أقل من ١٨ سنة): يتم بدء دراسة الأمان والفعالية لاستعمال ميكونازول كريم مهبلية عند الأطفال والمراهقين.

التحميل المهبلية:

البالغين والأطفال أكبر من ١٢ سنة: توضع تحميلية واحدة داخل المهبل مرة واحدة يومياً عن وقت النوم لمدة ٣ ليالي.
الأطفال (عمر أقل من ١٢ سنة): يجب استشارة الطبيب.
وقبل البدء بتطبيق دورة علاجية أخرى يجب إعادة التأكد من التشخيص بواسطة فحص المسحات وألا إجراء الزرع لأجل نفي أي عوامل مرضية أخرى.

مضادات الاستطباب:

وجود قرط تحسس معروف تجاه الميكونازول نيترات أو مشتقات الإيميدازول الأخرى أو أي من السواغات.

التحذيرات والاحتياطات:

- تم الإبلاغ عن تفاعلات قرط حساسية شديدة، بما في ذلك ثاق ووذمة وعائية أثناء العلاج بميكونازول كريم مهبلية ومع الأشكال الأخرى للميكونازول، يجب إيقاف العلاج في حال حدوث رد فعل يشير إلى قرط الحساسية أو التهيج.
- يجب استعمال العلاج المناسب أيضاً عند إصابة الشريك الجنسي.
- ميكونازول كريم مهبلية لا يقوم بتلويث الملابس أو الجلد.
- قد تقلل المستحضرات المضادة للتهابات المهبلية من فعالية موانع الحمل الميكانيكية لذلك يجب عدم استعماله بالتزامن مع الواقي الذكري أو الأنثري المطاطي.
- يجب تجنب استعمال المستحضرات المهبلية.
- يجب إخبار الطبيب قبل استعمال في حال كانت الإصابة بالمبيضات المهبلية متكررة (مرة كل شهر أو ثلاث مرات خلال ستة أشهر) من الممكن أن تكون حالة مرضية كامنة خطيرة (بما في ذلك مرض السكري أو أن الجهاز المناعي ضعيف) أو إذا كان شهور الإزعاج المهبلية والحكة للمرة الأولى.

يجب التوقف عن استعمال الدواء واستشارة الطبيب في حال:

- لم تحسن الأعراض خلال ثلاثة أيام.
- استمرت الأعراض لمدة أطول من سبعة أيام.
- إذا ظهر لدى المريض طفح أو شرى، ألم بطني، حمى، رشفة، غثيان، إقياء، أو مفزرات مهبلية ذات رائحة، من الممكن أن تكون حالة أكثر جدية.

التحليل المخبرية:

إذا كان هناك عدم استجابة لميكونازول تحميل مهبلية، يجب تكرار الدراسات الميكروبية المناسبة بشكل دوري للتأكد من التشخيص ونفي أي عوامل مرضية أخرى.

التفاعلات الدوائية:

- الميكونازول المطبق جهازياً معروف بتثبيته لإنزيم CYP3A4/2C9. نظراً للتوافر الجهازى المحدود بعد التطبيق المهبلية حدوث التداخلات السريرية يكون بشكل نادر جداً.
- يجب توخي الحذر عند المرضى الذين يتناولون مضادات التخثر الفوية، مثل الوارفارين، كما ينبغي مراقبة التأثير المضاد للتخثر بسبب احتمال حدوث نزف أو كمية.
- والتأثيرات والأثار الجانبية يمكن أن تزيد للأدوية الأخرى التي تستقلب بواسطة إنزيم CYP2C9 (مثل خافضات السكر الفوية والغيتونين) وكذلك للأدوية CYP3A4. (مثل: سيفماتسان، لوفاسنتان، وحاصرات قنوات الكالسيوم مثل: ثنائي هيدرات البيريدين والفيرايميل) عندما تأخذ بشكل متزامن مع الميكونازول ويجب أخذ الحذر عند ذلك.

العمل والإيضاح:

الحمل: بالرغم من أن الإمتصاص المهبلية محدود، ينبغي أن يستعمل ميكونازول في الأشهر الثلاث الأولى للحمل فقط إذا كانت المنفعة المرجوة تفوق المخاطر المحتملة.

الإرضاع: من غير المعروف فيما إذا كان ميكونازول تترات يطرح في حليب البشر. يجب توخي الحذر عند استخدام ميكونازول أثناء الرضاعة.

الأثار الجانبية:

شائعة جداً: الحكة التناسلية، إحساس بالحرقنة المهبلية، عدم ارتياح في الفرج والمهبل.

شائعة: الطفح الجلدي، عسر الطمث.

غير شائعة: حكة طفحية، طفح جلدي، الصداع، الحكة أو التهيج، مغص.

نادرة: شرى.

قرط الجرعة:

الأعراض: ميكونازول الكريم والتحميل المهبلية معد للاستخدام الموضعي وليس للاستخدام القوي. في حالة الإبتلاع بشكل عرضي، لا يتوقع حدوث أي مشاكل.

العلاج: في حالة الإبتلاع بشكل عرضي كمية كبيرة، ينبغي استخدام الرعاية الداعمة المناسبة.

شروط الحفظ:

- **الكريم المهبلية:** يحفظ في درجة حرارة بين (١٥-٢٥) °C.

- **التحميل المهبلية:** يحفظ في درجة حرارة بين (١٥-٢٥) °C.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

التعبئة:

الكريم المهبلية:

تيوب المليون يحتوي ٧٠ ميكوزالين كريم مهبلية مع حقن/علية كرتون.

التحميل المهبلية:

علية كرتون ميكونازولين تحوي ٣ تحميل مهبلية .

علية كرتون ميكونازولين تحوي ٦ تحميل مهبلية .

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
- الدواء: مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات عرضت لكخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال الموصى عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلي هما الحزينان بالذات، وينبغي وقصوه .
- لا تقطع دواء العلاج المحدد لك من تلقا نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .
- (مجلس وزراء الصحة العرب)

مفتريات ميديو تيك للصناعات الدوائية

ص.ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف ٢٢٢٢١٦٠٠