



ميكونزالين كورت

ميكونزالول نترات ٢% + هيدروكورتيزون (أسيتات) ١%
(كريم، مرهم، جلدي)

التركيب:

يحتوي كل ١٠٠ غ من (كريم، مرهم) ميكونزالين كورت: ميكونزالول نترات ٢ غ، هيدروكورتيزون (بشكل هيدروكورتيزون أسيتات) ١ غ.

السواغات:

ميكونزالين كورت كريم: سيتيل ستيريل الكحول وأوكسيد الإيثيلين، سيتوستيريل الكحول، زيت البافافين، حمض البنزوفينيك، دي سدوديوم أديتات، بوتيل هيدروكسي أنيزول، محلول هيدروكسيد الصوديوم، ماء منقى.

ميكونزالين كورت مرهم: بولي إيثيلين، هلامية البرافافين المسئلة.

الاستخدامات:

- لعلاج الموضعي للجلادات المترافقة بأخماج ناجمة عن عضويات حساسة للدواء، مثل المذخ والإكزيما الانتانية.
- الإكزيما الجافة أو الرطبة أو التهابات الجلد ومن ضمنها الإكزيما التقيئية، أو الإكزيما المبهجة الأولية أو الإكزيما التماسية التحسسية أو الإكزيما المثبية ومن ضمنها المرافقة لحب الشباب.
- الإكزيما المتحيجة ومن ضمنها المذخ الاتهابي، والتهاب الجلد حول الشرج والتهاب الجلد التنسلي.
- العضويات الحساسة للميكونزالول هي الفطريات الجلدية والخمائر المرخصة (مثل أنواع المبيضات)، وكذلك العديد من الجراثيم إيجابية الغرام ومنها معظم سلالات الميكروبات العفوية والمكورات العنقودية.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

ميكونزالين كورت معد للاستعمال الموضعي.

يطبق ميكونزالين كورت موضعياً على المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات يومياً. يجب تدليكها بلطف إلى أن يتم امتصاصها بشكل كامل من قبل الجلد. بسبب احتواء ميكونزالين كورت على ستيرينويد قشري، يجب تجنب العلاج به على المدى الطويل، والتوقف بمجرد اختفاء الأعراض الاتهابية (بعد حوالي ٧ أيام). يمكن أن يستمر العلاج عند الضرورة باستعمال ميكونزالين كورت (نترات الميكونزالول ٢٪)، ويجب الاستمرار بالمعالجة بدون توقف إلى أن تزول الآفة تماماً (عادةً بعد أسبوعين إلى خمسة أسابيع). إذا لم يحدث أي تحسن بعد التطبيق لمدة ١٥ أيام، فيجب محاصرة الكائن الممرض باستخدام مضاد جرثومي موضعي أو جهاز ي مناسب. تطبق نفس الجرعة سواء للمسنين أو للأطفال.

المسئوق:

يحدث لدى المسنين ترقق طبيعي للجلد. وبالتالي يجب أن يكون العلاج بالسيترونيديات القشرية بشكل منقطع وللفترة قصيرة من الزمن.

الأطفال:

لدى الرضع والأطفال، يجب توخي الحذر عند تطبيق ميكونزالين كورت على مساحات واسعة أو تحت ضمادات كثيفة (بما في ذلك حفاظات الأطفال).

يجب تجنب معالجة الرضع بـهيدروكورتيزون موضعي لفترة طويلة بشكل متواصل.

مضادات الاستطباب:

- فرط التحسس تجاه الميكونزالول أو الميكونزالول نترات أو المشتقات الإيميدازولية الأخرى، أو الهيدروكورتيزون أو أي من السواغات.
- أخماج الجلد السلية أو الفيرسية، أو الأخماج الناجمة عن الجراثيم سلبية الغرام.
- محاذير واحتياطات:
- عندما يستخدم ميكونزالين كورت لدى المرضى الذين يتناولون مضادات التخثر القوية، يجب مراقبة تأثير مضاد التخثر بعناية.
- تم الإبلاغ عن ردود فعل من فرط الحساسية الشديدة، بما في ذلك الناق والوذمة الوعائية أثناء العلاج بـ ميكونزالين كورت وغيره من المستحضرات الموضعية الحاوية على الميكونزالول. إذا حدث رد فعل يشير إلى فرط الحساسية أو التيجيج فيجب إيقاف العلاج.
- يجب تجنب تماس ميكونزالين كورت مع الأغشية المخاطية للعين.
- كما هو الحال مع أي ستيرينويد قشري موضعي، يجب توخي الحذر لدى الرضع والأطفال عندما يتم تطبيق ميكونزالين كورت على مساحات واسعة أو تحت ضمادات كثيفة (ومن ضمنها حفاظات الأطفال). وكذلك يجب تجنب التطبيق على الوجه.
- لدى الرضع، يجب تجنب العلاج بهيدروكورتيزون قشري موضعي لفترة طويلة ومستمرة. يمكن أن يحدث تثبيط كطري حتى ولو لم تستعمل الضمادات الكثيفة.
- بسبب احتواء ميكونزالين كورت على ستيرينويد قشري، يجب تجنب العلاج به على مدى طويل بمجرد اختفاء الأعراض الاتهابية يمكن أن يستمر العلاج بنترات الميكونزالول ٢٪ بشكل كريم أو بودرة.
- يمكن أن يسبب ميكونزالين كورت ضرراً لبعض المواد الاصطناعية. لذلك من المستحسن ارتداء ملابس داخلية قطنية إذا كانت هذه الملابس على تماس مع المنطقة المصابة.
- إن استعمال عازل منع الحمل أو الواقي الذكري بالتزامن مع مستحضرات مهبلية مضادة للالتهاب قد يخفف من فعالية موانع الحمل المطاطية (اللاكنس)، لذلك يجب تجنب استعمال ميكونزالين كورت بالتزامن مع استعمال عازل منع الحمل أو الواقي الذكري.

اضطرابات الرؤية:

قد يتم الإبلاغ عن حدوث اضطراب بصري عند استخدام السيترونيديات القشرية الجهازية والموضعية. إذا كان المريض يعاني من أعراض مثل تغير الرؤية أو اضطرابات بصرية أخرى فيجب أن يراجع المريض طبيب عيون لتقديم الأسباب المحتملة والتي قد تشمل الساد أو الزرق أو أمراضاً نادرة مثل اعتلال المشيمية والشبكية المركزي المسالية والتي أبلغ عنها بعد استخدام السيترونيديات القشرية الجهازية والموضعية.

التحاذير:

من المعروف أن الميكونزالول المعطى جهازياً يثبط إزيمات CYP3A4 / 2C9. بسبب محدودية التوافر الجهازى بعد التطبيق الموضعي فإن حدوث ردود أفعال ذات صلة سريرية أمر نادر جداً، ومع ذلك يجب توخي الحذر لدى المرضى الذين يستعملون مضادات التخثر القوية مثل الوارفارين، ويجب مراقبة التأثير المضاد للتخثر. الميكونزالول مثبط لـ CYP3A4 مما قد يقلل من معدل استقلاب الهيدروكورتيزون. قد تكون التراكيز المعصية للهيدروكورتيزون أعلى مع استخدام ميكونزالين كورت مقارنة مع المستحضرات الموضعية الحاوية على الهيدروكورتيزون وحده.

الحمل:

إن البيانات السريرية على استخدام ميكونزالين كورت أثناء الحمل محدودة. وفي التجارب على حيوانات التجربة تبين أن السيترونيديات القشرية تعبر المشيمة وبالتالي يمكن أن تؤثر على الجنين. يمكن لإعطاء السيترونيديات القشرية للحيوانات الحوامل أن يسبب تشوهات في تطور الجنين. لم يتم تحديد أهمية هذه النتائج لدى البشر. كإجراء وقائي، من الأفضل تجنب استخدام ميكونزالين كورت أثناء الحمل. ولا ينصح بعلاج مساحات كبيرة أو التطبيق تحت ضمادات كثيفة.

الإرضاع:

لا توجد دراسات كافية ومضبوطة حول التطبيق الموضعي لـ ميكونزالين كورت خلال فترة الإرضاع. ومن غير المعروف ما إذا كان التطبيق الموضعي المستمر لـ ميكونزالين كورت على الجلد يمكن أن يؤدي إلى امتصاص جهازى كافٍ لإنتاج كميات من الهيدروكورتيزون والميكونزالول قابلة للكشف عنها في حليب الأم.

لا يمكن استبعاد وجود خطر على الأطفال حديثي الولادة.

يجب اتخاذ قرار إما بالتوقف عن الإرضاع أو إيقاف العلاج بـ ميكونزالين كورت مع الأخذ في الاعتبار فائدة الإرضاع الطبيعي للطفل واستفادة الأم من العلاج. لا ينصح بمعالجة مساحات كبيرة أو التطبيق تحت ضماد كثيف.

الآثار الجانبية:

الآثار الجانبية		الغفلة
التواتر		
غير شائع ≤ ١/١٠٠٠ و ١/١٠٠	غير محدد	
رد فعل تأقي، فرط تحسس.	تهيج الجلد، شعور بحرقة الجلد، شرى، الحكّة.	اضطرابات الجهاز المناعي
وذمة وعائية، طفح، التهاب الجلد التماسي، حمامي، التهاب الجلد، نقص تصنيع الجلد، رد فعل في موضع التطبيق.	تهيج الجلد، شعور بحرقة الجلد، شرى، الحكّة.	اضطرابات في الجلد والأشجعة ما تحت الجلدية
تغير الرؤية	هيجية	اضطرابات عامة وفي موضع التطبيق
		اضطرابات بصرية

فرط الجرعة:

الأعراض:

الاستخدام المفرط وطويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد، والذي عادةً ما يختفي بعد التوقف عن العلاج. يمكن أن يتم امتصاص الكورتيكوستيرونيديات الموضعية بكميات كافية لإنتاج تأثيرات جهازية.

الخواص الدوائية:

الخواص الديناميكية الدوائية:

إن الميكونزالول نترات فعال ضد الفطريات الجلدية والخمائر المرخصة، والعديد من الجراثيم موجبة الغرام. الهيدروكورتيزون ستيرونيدي قشري مضاد للالتهاب. ينجم تأثيره المضاد للالتهاب عن إنقاص العناصر الوعائية لرد الفعل الاتهابي، وكبح هجرة الكريات البيض متعددة النوى، وعكس التغيرات المترافقة للشعيرات الدموية. إن التأثير المضيق للأوعية للهيدروكورتيزون قد يسهم أيضاً في فعالية المضادة للالتهاب.

الحركية الدوائية:

الامتصاص:

يبقى الميكونزالول في الجلد لمدة تصل إلى ٤ أيام بعد التطبيق الموضعي. الامتصاص الجهازى للميكونزالول محدود، مع توافر حوافر أقل من ١٪ بعد التطبيق الموضعي للميكونزالول. التراكيز البلازمية للميكونزالول وألوا مستقيمتها كانت قابلة للقياس بعد ٢٤ و ٤٨ ساعة من التطبيق. يمتص حوالي ٢٪ من جرعة الهيدروكورتيزون بعد تطبيقه على الجلد.

التوزيع:

يرتبط الميكونزالول الممتص ببروتينات البلازما (٨٢،٢٪) وكريات الدم الحمراء (١٠،٦٪)، ويرتبط أكثر من (٩٠٪) من الهيدروكورتيزون ببروتينات البلازما.

الاستقلاب والإخراج:

الكميات الصغيرة المنصصة من الميكونزالول تنطرح غالباً عبر البراز سواء بشكل غير متبدل أو مستقلب خلال ٤ أيام عقب التطبيق. كما تظهر في البول كميات أقل غير متبدلة أو مستقيمة.

يبلغ نصف عمر الهيدروكورتيزون حوالي ١٠٠ دقيقة. يتم استقلابه في الكبد والأستجة وتنطرح المستقلبات عبر البول، ومعظمها بشكل غلوكورونيدات، بالتزامن مع كميات ضئيلة جداً من الهيدروكورتيزون غير المتبدل.

التنقبات:

يجب تجنب تماس ميكونزالين كورت مع منتجات المطاط الصناعي (اللاكنس) مثل عازل منع الحمل أو الواقي الذكري إذ أن مكونات ميكونزالين كورت قد تسبب ضرراً لللاكنس.

شروط الحفظ:

- "يحفظ في درجة حرارة الغرفة، أقل من ٢٥ °م".
- "لا يجمد".
- "يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال".

التعليق:

تويوب المنيوم يحوي ١٥ غرام ميكونزالين كورت كريم .

تويوب المنيوم يحوي ١٥ غرام ميكونزالين كورت مرهم .

0811 Ed01 05/2020

* هذا دواء *

- لاتترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

- الدواء - مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات يعرضك للخطر .

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .

- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وينفعهم وفهمه .

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .

- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .

(مجلس وزراء الصحة العرب)

(اتحاد الصيدادلة العرب)

مفتبرات ميديوتيك للصناعات الدوائية

ص.ب.٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف : ٢٢٢٢١٦٠٠

