



نيستاميتازون (كريم)

التركيز: كل ١ غ من كريم نيستاميتازون تحتوي: ١٠٠٠٠٠ وحدة دولية نيستاتين، ١١,٥ ملغم كلورهيكسيدين ديبيروكلوريド، ١ ملغم ديسكاميتيازون.

السواءات: فازلين، لاثولين، شمع النحل، شمع البارافين، زيت البارافين، زيت الذرة، كوتينا GMS، يمولجين B2، سيلوستيريل الكحول.

الخصائص:

يعلم النسيطات كمبيد للقطريات عن طريق تشكيل معقد مع سترول الشاء البيبرولي وتغير جدار الخلية لل قطرور.

يعمل الكلورهيكسيدين بشكل مضادات الميكروبات عن طريق إمتازالجزء الكاتيوني في جدار الخلية للميكروبات. التغيير الناتج في فناذية

جدار الخلية يسبب تمرس مواد داخل الخلية أو اختراق الكلورهيكسيدين إلى البيبرولي.

الديسكاميتيازون يأمل سكري اصطناعي متوازن القوة، الذي يسبب تأثيرات مضادة للالتهاب، مضادة للحساسية، موقف للحكمة، مثبطة

للمناعة ومضادة للتكاثر.

الحركة الدوائية:

يتم امتصاصه من طرق تشكيل معقد مع سترول الشاء البيبرولي ووضعياً عبر الجلد السليم والأغشية المخاطية وذلك بمستويات منخفضة. ليست هناك

بيانات دقيقة متاحة عن الامتصاص والحركة الدوائية.

يعتمد تغلغل الديسكاميتيازون ونفوذه على مكان الإصابة، حالة الجلد، العمر وطريقة التطبيق. في الظروف العادي، فقط جزء ضئيل من الجرعة

المطبقة تؤثر جهازياً.

الاستطبابات:

الكلورهيكسيدين والكلورهيكسيدين عند تطبيقهما موضعياً عبر الجلد السليم والأغشية المخاطية وذلك بمستويات منخفضة. ليست هناك

بيانات دقيقة متاحة عن الامتصاص والحركة الدوائية.

قبل بدء العلاج، يجب إجراء الكشف الأمن عن المبيدات (الزرع).

مضادات الاستطباب:

فرط الحساسية للمواد الفعالة أو تجاه أي من المبيدات.

• عمليات جلدية ممددة (الزهري، السل)، جدرى الماء (الحمac)، ردود فعل التلقيح، العد الوردي، التهاب الجلد حول الفم.

التحفيزات والاحتياطات:

• يجب تجنب التطبيق على العين والأذن.

• يجب عدم تطبيق الكريم على الجروح المفتوحة.

• يشكل عام يتطلب العلاج الواسع النطاق وطويل المدة عملية خاصة، حيث يجب لا يتم تجاوز زمن التطبيق المستمر من ٣-٢ أسابيع إن كان ذلك ممكناً.

• يجب استخدام الستيرونيدات القشرية القوية جداً والقوية ومتوسطة القوة على الوجه وفي المنطقة التناسلية بحذر ولقدرة لا تزيد على أسبوع.

• قد تخفي الستيرونيدات القشرية أعراض تحسّس الجلد تجاه أي من مكونات المستحضر.

• إذا لم يحدث أي تحسن في غضون بضعة أيام، يجب إعادة النظر في التشخيص. يمكن أن يكون السبب عدوى إضافية بجرثومة مقاومة أو فرط الحساسية تجاه أي من مكونات المستحضر.

الحمل:

بعد هذا المستحضر مضاد استطباب أثناء الحمل.

الارضاع:

لا تتوفر بيانات عن استخدام هذا الدواء خلال الارضاع. يعبر ديسكاميتيازون عبر المشيمة ويمكن أن يعبر إلى حليب الأم بعد التطبيق الموضعي. لذلك يجب عدم استخدام هذا الدواء عند الأمهات المرضعات.

التدالكت الأدوية:

بالمشاركة مع المضادات الحيوية، يمكن أن يؤثر النسيطات على آثارها بشكل تآزر (أوكسي ترايسينلين) أو ضادة (الكلورامفينيكول).

عد التوافق:

يمكن إبطال عمل الكلورهيكسيدين بفعل الصابون.

النسيطات غير قابل بوجود شوارد المغذينيوم والكلاسيوم، الحموض الذهنية، السيستين، الغلوتالين، صوديوم ثيوجلوكولات، الغلوكوز، المالتوز، الالكتوز، وقاء الفوسفات والمصل.

التأثيرات الجانبية:

عادة ما يكون جيد التحمل على الجلد والأغشية المخاطية. إذا تدهورت الحالة، يجب إيقاف العلاج ويجب استشارة الطبيب.

احياناً: تهيج الجلد، حرقة، احمرار، حكة.

نادرًا: ردود فعل لفرط الحساسية موضعية.

فرط الجرعة وطريقة الاعطاء:

يتطبع ٣-٢ مرات يومياً على الجلد والأغشية المخاطية. يجب لا تزيد مدة التطبيق عن ١٠ أيام.

فرط الجرعة:

ليس لها صلة بالنسبة للنسبيتين والكلورهيكسيدين، بما أن كلاهما لا يمتصان بشكل عملي. يمتص ديسكاميتيازون بشكل قليل فقط بالمقارنة بالفترات الأخرى، تحدث الآثار الجانبية الموضعية أو الجهازية فقط بعد العلاج الواسع وطويل الأمد. الأعراض هي الناتجة عن فرط جرعة الستيرونيدات القشرية، وبعد التراويق هو إيقاف المستحضر.

شروط التخزين:

- يحفظ في درجة حرارة الغرفة، بين (١٥ - ٣٠) °م.

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

التعينة: علبة كرتون تحتوي تبويب المنزوع يحتوي ٢٠ غ نيستاميتازون كريم.

01/2021 Ed04 0746

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

- الدواء مستحضر ي يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيادي الذي صرفها لك.

- الطبيب والصيدلي هما المخربان بالدواء وينفعه وضرره.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاً نفسك.

- لا تكرر صرف الدواة من دون وصفة طبية.

(مجلس وزراء الصحة العرب)



مفتيرات ميديوتيك للصناعات الدوائية

ص.ب. ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٢٦٠