



هيالو - سلفا

صوديوم هيبالورونات + سلفاديازين الفضة
كريم جلدي



التركيب :

كل ١ غ كريم يحوي: حمض الهيالورونيك (ملح الصوديوم) ٢ ملغ، سلفاديازين الفضة ١٠ ملغ.

السواغات:

بولي إيثيلين غليكول، ديسيل إيستر أوليات، شمع استحلابي، غليسيرول، سوربيتول، ماء منقى.

آلية العمل:

يحسن الكريم حالة المريض من خلال أداء الوظائف التالية:

- يعمل على غشاء الخلية وجدار الخلية ويمنع مختلف عمليات الانقلاب البكتيري.

الاستطبابات:

يستطب الكريم لتبديد الآفات الجلدية، وخاصة تلك المعرضة لخطر العدوى. على وجه الخصوص، الغرض منه هو تغطية الجروح الحادة والمزمنة (حروق من الدرجة الأولى والثانية، قرحة الأوعية الدموية والاستقلابية وتقرحات الضغط) وتوفير بيئة رطبة خالية من الميكروبات. يمكن استخدام الكريم على الجروح غير الإنتانية للمساعدة في منع العدوى واتباع العلاج الناجح للجروح الإنتانية للمساعدة في منع تكرار الإنتان.

مضادات الاستطباب:

- حب الشباب
- فرط الحساسية
- الرضاعة
- حديثي الولادة
- البورفيريا
- الحمل

لا يعطى للمرضى الذين يعانون من فرط الحساسية الفردية المؤكدة لمكونات المنتج أو مع فشل الكبد أو الكلى أو نقص الإنزيم ٦- فوسفات دي هيدروجيناز.

لا يعطى للنساء الحوامل والرضع.

الآثار الجانبية :

- الطفح الجلدي
- يحفز السلفوناميد السمية الجهازية
- التهاب الكلى الخلالي
- الحساسية
- انخفاض مؤقت في عدد خلايا الدم البيضاء
- تلون الجلد
- الشعور بالحرقه
- جفاف الجلد
- موت الخلايا
- الفشل الكلوي، التهاب الكبد السام، ندرة المحببات، قلة الصفائح، قلة الكريات البيض.

المحاذير والاحتياطات :

رمي العبوة بعد شهر من فتحها.

تجنب ملامسة العبوة للجرح مباشرة.

يجب استخدام كل تيوب من الكريم من قبل مريض واحد فقط ، من أجل الحد من خطر العدوى المتقاطعة.

تجنب تعرض المناطق المعالجة لأشعة الشمس، حيث أن المنتجات المحتوية على سلفاديازين الفضة قد تلوث الجلد باللون الرمادي. يمكن بسهولة إزالة أي تطليخ بغسل المنطقة.

يجب علاج الحروق والتقرحات الشديدة والواسعة تحت إشراف الطبيب.

تحتاج القروح الواسعة أو الإنتانية الشديدة، مثل تلك الناتجة عن اللدغات واللسعات، إلى علاج من قبل الطبيب (خطر الإصابة بالكرزاز).

ينصح باستشارة الطبيب في حالة تورم الجرح واحمراره، الجرح متورم ومؤلم، وإذا ارتفعت درجة حرارة الجسم (خطر التسمم بالدم).

التداخلات:

لا يستخدم بالتزامن مع المظهرات التي تحتوي على أملاح الأمونيوم الرباعية أو مع الإنزيمات المحللة للبروتين المطبقة موضعياً، لأنها يمكن أن تتداخل مع المنتج.

قد يتداخل الكريم مع الأدوية والمنتجات التالية:

- بنزوكاين
- سيتيل بيريندينوم
- لينوكاين
- بوفيدون النود
- سلفاسيتاميد الصوديوم
- تولوتاميد
- تريميثوبريم

الجرعة وطريقة الإعطاء:

يجب تنظيف الآفات قبل كل تطبيق. ضع طبقة رقيقة من الكريم على سطح الجرح، مرة أو مرتين يومياً حسب شدته، حتى يحدث الشفاء التام. يجب تقييم العلاجات المطولة، على مدى شهر، من قبل الطبيب على أساس التطور السريري للآفة. يجب تغطية المنطقة المعالجة بضماد معقم.

شروط الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

يحفظ بدرجة حرارة الغرفة، أقل من ٣٠°م، بعيداً عن الضوء.

يستخدم خلال ٦ أشهر بعد فتح العبوة.

التعبئة:

تيوب النيوم يحوي ٢٥ غرام أو ١٠٠ غرام

0809 Ed02 10/2021

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
- الدواء مستحضر يوزع في صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات يعرفها الخطر ،
- تتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب الصيدلي هذا يحظر بالذواء وينهه وفرد ،
- لا تطلع مد: (علاج الحادة) بالذواء، بل فقط لنفسك .
- لا تترك صرف الدواء من دون وصفة طبية .
- (مجلس وزراء الصحة العرب)

مفتبرات ميديوتيك للصناعات الدوائية

ص ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف: ٢٢٢٢١٦٠