



هيدرامين (مضغوطات)

ديميهيدرينات 50 ملغ

التحذير: كل مضغطة هيدرامين تحتوي على ٥٠ ملغ ديميهيدرينات.

المواصفات: لاكونز مائي، نشاء، تالك، شمعات المغنيزيوم، إيروزيل، كروس كارميلوز الصوديوم، بوفيدون، ماء منزعج الشوارد، صيغة صفراء.

الحركة الدوائية:

يتمص ديميهيدرينات من السبيل المعدي المعوي بعد تناوله فوياً بشكل جيد مع تأخير مرور أولي شديد. يتم استقلاب الدواء في الكبد ويخرج عادة كمستقلبات في البول. يرتبط الدواء ببروتينات البلازما بشكل كبير ويتم توزيعه في الجسم على نطاق واسع. بعد تناوله فوياً، تبدأ التأثيرات في حوالي ٢٠ دقيقة وتكون أقصى ما يمكن في غضون ٢-١ ساعة وتستمر لمدة ٢-٣ ساعات.

الوقاية والعلاج:

- الوقاية والعلاج من الأعراض المرتبطة بدوار الحركة:

- الغثيان
- الإقياء
- الدوخة

- يستخدم ديميهيدرينات بشكل رئيسي كمضاد للإقياء في الوقاية من داء الحركة وعلاجه؛ دوار التشنج، والإقياء بعد العمليات الجراحية، الغثيان والإقياء الناتج عن الأدوية، والعلاج من أعراض الغثيان والدوار بسبب داء مينيير وغيرها من الاضطرابات البهيمية.

مضادات الاستطباب:

- الحساسية للديميهيدرينات أو أي من المكونات الأخرى.

- لدى المرضى الذين يعانون من البورفيريا.

- الأطفال دون سن العامين.

التحذيرات والاحتياطات:

- لا ينبغي أن يستخدم لدى الأطفال دون سن ٢ سنة من العمر ما لم يكن موجهاً من قبل الطبيب.

يجب على المرضى استشارة الطبيب قبل الاستخدام إذا كان لديهم:

- مشكلة في التنفس مثل الفواق المزني أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.

- الزرق.

- صعوبة في التبول بسبب تضخم غدة البروستات.

يجب على المرضى استشارة الطبيب قبل الاستخدام إذا كانوا:

- يتناولون المركبات أو المهدئات.

عند استخدام هذا المنتج:

- قد يحدث نعاس ملحوظ.

- يجب تجنب المشروبات الكحولية.

- قد تزداد الدوخة عن طريق الكحول والمركبات والمهدئات.

- يجب توخي الحذر عند قيادة السيارة أو تشغيل الآلات.

يجب استخدام ديميهيدرينات بحذر عند المرضى الذين يعانون من:

- الصرع.

- تضخم البروستات أو احتباس البول.

- الزرق.

- أمراض الكبد.

- انسداد الأمعاء عثري.

- المرضى الذين يعانون من اختلال كلوي، قد يكون من الضروري تخفيض جرعة أي مضاد للهستامين (على سبيل المثال، الديميهيدرينات).

- يجب أن يكون الاستخدام للأطفال بعمر دون ٦ سنوات فقط بمشورة طبية.

- لا ينبغي أن يؤخذ الديميهيدرينات مع أدوية السعال والبرد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦-٢ سنوات من العمر.

- الأطفال وكبار السن أكثر عرضة لآثار الأفيونية.

- اقترح أن الديميهيدرينات يمكن أن يخفي أعراض التحذير من الأضرار الناجمة عن الأدوية السامة لأن من مثل المضادات الحيوية من فئة الأمينوغليكوزيدات.

- يجب على المرضى الذين يعانون من مشاكل روائية نادرة من عدم تحمل غالاكتوز، وعوز اللاكتاز أو سوء امتصاص الفركتوز-غالاكتوز عدم تناول هذا الدواء.

الحمل أو الرضاعة الطبيعية:

- لا ينبغي استخدام ديميهيدرينات خلال الحمل إلا إذا اعتبر الطبيب أنه ضروري.

- يتم إفراز ديميهيدرينات في حليب الأم إلى حد تكون فيه الآثار على الطفل الرضيع محتملة إذا تم إعطاء جرعات علاجية من ديميهيدرينات للنساء المرضعات.

التأثير على القدرة واستخدام الآلات:

- لا ينبغي على المرضى الذين يخضعون للعلاج بديميهيدرينات أن يتولوا مسؤولية المركبات ووسائل النقل الأخرى أو الآلات حيث قد يؤدي فقدان الاتزان إلى حدوث حوادث لأن ديميهيدرينات قد يسبب النعاس وبداية في البقطة العقلية.

التفاعلات الدوائية:

- يتفاعل ديميهيدرينات مع مضادات الكولين، مضادات الاكتئاب (ثلاثية الحلقات (MAOIs) والأدوية المضادة للباركينسون مثل التري هكسفينيدل، مما يزيد من الآثار الجانبية لمضادات الكولين، جفاف الفم، احتباس البول، الارتباك، الخ.

- قد يعارض آثار بيتاهستامين.

- قد تعزز مضادات الهيستامين المهدنة الآثار المهدنة لمقبطات الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك الكحول ومضادات الهيستامين المهدنة الأخرى، الباربيتورات، المونومات، الأفيونيات، المهدئات المضادة للقلق ومضادات الدخان.

- من المهم أن يتم خفض جرعة اليبيريدين أو المورفين أو غيرها من المسكنات المخدرة والباربيتورات بمقدار ¼ أو ½ عند استخدامها بشكل متزامن.

التأثيرات الجانبية:

- قد تختلف التأثيرات الجانبية للديميهيدرينات في الحدوث والشدة من مريض لآخر. التأثير الأكثر شيوعاً هو الترنك الذي قد يتراوح من الدوخة الطفيف إلى النوم العميق. قد يرتبط الدواء بعدم القدرة على التركيز، الإرهاق، الدوخة، انخفاض ضغط الدم، الضعف العضلي والتشنج. عندما تحدث، قد تقل الديميهيدرينات المهدنة بعد بضعة أيام.

الجرعة والاستخدام:

- لمنع دوار الحركة أو معالجته، يجب تناول أول جرعة قبل نصف ساعة إلى ساعة قبل البدء بالأنشطة البدنية والأطفال ١٢ سنة فأكثر:

من ١ إلى ٢ مضغطة كل ٤-٦ ساعات.

- يجب عدم تناول أكثر من ٨ مضغطات خلال ٢٤ ساعة، أو حسب إرشادات الطبيب.

الأطفال من ٦ سنوات حتى أقل من ١٢ سنة:

من ½ إلى مضغطة واحدة كل ٨-٦ ساعات.

- يجب عدم إعطاء أكثر من ٣ مضغطات خلال ٢٤ ساعة، أو حسب إرشادات الطبيب.

الأطفال من سنتين إلى أقل من ٦ سنوات:

- ½ مضغطة كل ٨-٦ ساعات.

- يجب عدم إعطاء أكثر من مضغطة ونصف خلال ٢٤ ساعة، أو حسب إرشادات الطبيب.

مضاد استطباب للأطفال بعمر أقل من سنتين.

كبار السن:

- نفس جرعة البالغين.

طريقة الجرعة:

- في حالة قوط الجرعة الشديدة، ينبغي إفراغ المعدة عن طريق غسيل المعدة. لا ينبغي استخدام المضخات.

- يجب أن يبقى المريض هادئاً، خاصة في حالة الأطفال، لتقليل الإثارة إلى الحد الأدنى.

- يمكن السيطرة على الاختلاجات باستخدام الديازيبام ويضلل أن يعطى عن طريق الوريد. نظراً لأن ديميهيدرينات يستقلب بشكل سريع مع استرجاع القليل فقط في البول، فإن إدرار البول يكون ذو قيمة ضئيلة، إن وجدت.

التحذير:

- شريط بليستري، ١٠ شريط بليستري، ٣٠ شريط بليستري، ١٠٠ مضغطات.

شروط التخزين:

- يحفظ بعيداً عن الضوء والرطوبة.

- يحفظ في درجة حرارة الغرفة، بين (٥ - ٣٠)°م.

0752 Ed02 11/2020

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

- الدواء مستحضر يؤثر على صحته واستهلاكه خلافاً لتعليمات بعضات الخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استعمال الخصوص عليه وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب والصيدلي هما الحريان بالدواء وتبذنه وفرضه.

- لا تفرغ دواء العلاج المهددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية.

- مجلس وزراء الصحة العربي

مضغطات مديوتيك للصناعات الدوائية

ص ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف ٢٢٢٢١٦٠

